

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ  
лекарственного средства  
ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ  
(TABULETTAE CONTRA TUSSIM)**

**Прочитайте внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!**

**Внимательно прочтите весь Листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию. Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше (инструкции).**

**Сохраните этот Листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.**

**Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.**

**Этот препарат предназначен лично для Вас и не следует передавать его другим лицам. Это может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.**

**Торговое название:** Таблетки от кашля.

**Международное непатентованное название:** нет.

**Описание**

Круглые плоскоцилиндрические таблетки зеленовато-серого цвета с фаской. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

**Состав на 1 таблетку:**

**Активные вещества:**

Термопсиса ланцетного трава - 6,7 мг

Натрия гидрокарбонат - 250 мг

**Вспомогательные вещества:** крахмал картофельный, стекло. 10 от « 29-11-2019 » г. № 14002

**Форма выпуска:** таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие препараты. Комбинированные препараты.

**Код ATХ:** R05CA10.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит).

**Способ применения и дозировка**

Внутрь. Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней.

Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

<b>СОГЛАСОВАНО</b>	
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Приказ Министерства здравоохранения	
Республики Беларусь	
от « 29-11-2019 »	г. № 14002
от « 04-11-2019 »	г.

*Если при использовании лекарственного средства симптомы сохраняются, или происходит ухудшение состояния, или развилось затруднение дыхания, поднялась температура или появилась гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.*

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, тошнота.

*Если любые указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом Вашему врачу.*

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

Не следует назначать препарат при легочных заболеваниях со склонностью к кровохарканию (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).

#### **Передозировка**

*Симптомы:* тошнота, рвота.

*Лечение:* промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия.

#### **Меры предосторожности**

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначать обильное теплое питье.

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,0279 г углеводов (0,0023 ХЕ).

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (появляются нарушения дыхания, поднимается температура, появляется гнойная мокрота или другие симптомы), необходимо обратиться к врачу.

#### **Применение при беременности и период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**

Таблетки от кашля не влияют на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты.

*Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!*

**Условия хранения и срок годности**

В защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

4 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Упаковка**

10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

1, 3 или 5 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

**Производитель**

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: (843) 571-85-58; факс 571-85-38

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Зам. генерального директора  
по технологии  
АО "Татхимфармпрепараты"

И.Р.Абдуллин

