

Листок-вкладыш – информация для пациента
Граммидин® детский, 1,5 мг+1 мг, таблетки для рассасывания.
 Действующее вещество: грамицидин С+цетилпиридиния хлорид.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.


Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Граммидин® детский и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Граммидин® детский.
3. Применение препарата Граммидин® детский.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Граммидин® детский.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. Что из себя представляет препарат Граммидин® детский и для чего его применяют
 Препарат содержит действующие вещества грамицидин С+цетилпиридиния хлорид. Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.
 Препарат обладает противомикробным и противогрибковым (*Candida albicans*) действием, не влияет на микобактерии.

Показания к медицинскому применению


Препарат показан к применению у взрослых и детей от 6 лет (для данной лекарственной формы) по показанию местное симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Граммидин® детский
Противопоказания

Не принимайте препарат Граммидин® детский:

- если у Вас аллергия на грамицидин С+цетилпиридиния хлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас наследственная непереносимость фруктозы (препарат содержит сорбитол);
- если Вы беременны;
- если возраст ребенка меньше 6 лет (для данной лекарственной формы препарата Граммидин® детский).



Особые указания и меры предосторожности

Обязательно сообщите врачу, если во время применения препарата Вы отметили, что симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (поднимается температура, появляется кашель, головная боль, рвота и др.)

Особые указания

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно сообщите врачу:

- если у Вас имеются повреждения слизистой оболочки рта (не рекомендуется принимать препарат из-за возможного угнетения процессов заживления (репарации));
- если у Вас аллергия (не следует принимать препарат при контактной аллергии, так как возрастает вероятность повышения чувствительности к аллергену (сенсibilизации)).

Меры предосторожности

Применение препарата может временно изменять вкусовые ощущения, но в течение 4 часов после приема препарата восприятие вкуса восстанавливается. Принимать препарат рекомендуется после еды (см. раздел 3 листка-вкладыша).

Длительное применение может вызвать незначительное временное коричневое окрашивание зубов и языка, но эти явления проходят после отмены препарата.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 6 лет в связи с риском случайного попадания таблетки в дыхательные пути вместо пищевода (риск аспирации).

Другие препараты и препарат Граммидин® детский

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали, или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не рекомендовано одновременное применение с другими препаратами местного действия по данному показанию.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Не принимайте препарат во время беременности в связи с отсутствием достаточных данных.
- Данные о проникновении действующих компонентов в грудное молоко отсутствуют. Прием препарата не рекомендован во время грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния применения препарата на скорость реакции не проводились. Исходя из профиля побочных реакций влияние препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не ожидается.

Препарат Граммидин® детский содержит аспартам, сорбитол

Аспартам

Препарат содержит аспартам, источник фенилаланина и может оказаться вредным, если у Вас заболевание, связанное с нарушением гидроксилирования фенилаланина (фенилкетонурия). Данное заболевание характеризуется накоплением в организме аминокислоты и продуктов ее метаболизма, что ведет к тяжелым поражениям центральной нервной системы.

Сорбитол

В связи с содержанием сорбитола, препарат не рекомендовано принимать, если у Вас врожденная непереносимость фруктозы.

В связи с содержанием сорбитола, препарат может оказывать легкое слабительное действие.

3. Применение препарата Граммидин® детский

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки, или медицинской сестры.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Рекомендуемая доза

По 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут) 4 раза в день.

Максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Применение у детей и подростков

Препарат Граммидин® детский в форме таблетки для рассасывания, не разрешен к приему детям до 6 лет. Другая форма препарата Граммидин® может лучше подходить детям, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Доза для детей от 6 лет будет рассчитана врачом исходя из возраста ребенка:

Дети старше 12 лет

По 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут) 4 раза в день.

Максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Дети от 6 до 12 лет

По 1 таблетке 4 раза в день.

Максимальная суточная доза - 4 таблетки.

Способ применения

Местно. Применяется после еды, путем рассасывания во рту, не разжевывая.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

Продолжительность терапии

Препарат не рекомендуется принимать более 7 дней. В случае отсутствия терапевтического эффекта или ухудшения состояния, а также для принятия решения о возможности более длительного применения следует обратиться к врачу.

Если Вы приняли препарата Граммидин® детский больше, чем следовало

Информация о случаях передозировки отсутствует. Учитывая количества активных и вспомогательных веществ, содержащихся в 1 таблетке, возможность передозировки минимальная.

Если Вы приняли препарата больше, чем следовало у Вас могут возникнуть следующие симптомы:


- тошнота, рвота;
- понос (диарея);
- вздутие живота, чувство распирания и боли (метеоризм);

Если Вы отметили у себя перечисленные выше симптомы немедленно обратитесь к лечащему врачу, возможно Вам потребуется лечение в зависимости от Вашего состояния и симптомов.

Если Вы забыли принять препарат Граммидин® детский

Если Вы забыли принять препарат вовремя, пропустите эту дозу и примите следующую в запланированное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Вместо этого дождитесь времени следующего приема препарата.

При наличии вопросов по приему препарата, обратитесь к лечащему врачу.



4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Грамминдин® детский может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергические реакции;
- изменение вкуса;
- раздражение слизистой оболочки рта, задержка заживления ран слизистой оболочки рта.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- тошнота;
- рвота.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

г. Минск, 220037, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29.



5. Хранение препарата Грамминдин® детский

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Грамминдин® детский содержит

Действующими веществами препарата являются грамицидин С - 1,50 мг (в виде грамицидина С дигидрохлорида - 1,60 мг), цетилпиридиния хлорид - 1,00 мг (в виде цетилпиридиния хлорида моногидрата - 1,05 мг).

Вспомогательными веществами препарата являются кремния диоксид коллоидный, тальк, лимонной кислоты моногидрат, аспартам, ароматизатор малиновый, сорбитол, магния стеарат.

Внешний вид препарата Грамминдин® детский и содержимое упаковки

Таблетки для рассасывания, 1,5 мг+1 мг.

Внешний вид препарата Грамминдин® детский:

Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с тиснением «GR» на одной стороне и запахом малины. Допускается незначительная мраморность.

Содержимое упаковки препарата Грамминдин® детский:

По 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку с перфорацией из пленки поливинилхлоридной или поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

АО «Валента Фарм»

141108, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Тел. +7 (495) 933 48 62,

факс +7 (495) 933 48 63.

Электронный адрес: info@valentapharm.com

Листок-вкладыш пересмотрен

