

Согласовано
решением ККС
н/11 от 25.08.17
Лука

НД РБ

2883 - 2017

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Уважаемый пациент,

Внимательно прочтайте инструкцию перед приемом препарата.

Сохраните инструкцию, возможно, Вам потребуется перечитать ее снова.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
02.11.2017 № 1253

Мастодинон®

Лекарственное средство при мастопатии, предменструальном синдроме, нарушениях менструального цикла

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Состав

1 г (соответствует 1,08 мл) капель Мастодинон ® содержат:

Vitex agnus castus ø (Витекс священный или Авраамово дерево)	200 мг
Caulophyllum thalictroides D4 (Стеблевист vasiliстниковидный)	100 мг
Cyclamen purpurascens D4 (Цикламен европейский).	100 мг
Strychnos ignatia D6 (Чилибуха игнация)	100 мг
Iris versicolor D2 (Ирис разноцветный)	200 мг
Lilium tigrinum D3 (Лилия тигровая)	100 мг

Вспомогательное вещество этанол.

Содержание этанола 47 – 53 % об/об

1 г соответствует приблизительно 37 каплям.

Описание

Прозрачная жидкость желтоватого цвета с ароматным запахом. При хранении возможно легкое помутнение или небольшое образование хлопьевидного осадка.

Производитель:

БИОНОРИКА СЕ

Кершенштайннерштрассе 11-15,

92318 Ноймарк

Телефон: 09181 231-90

Факс: 09181 231-265

Интернет: www.bionorica.de

Представительство в Республике Беларусь
220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н
тел/факс (+375 17) 342-40-08, 271-40-13
e-mail office@bionorica.by



Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство.

Область в рамках гомеопатического применения включает комплексную терапию:

- мастопатии;
- предменструального синдрома (болезненное напряжение молочных желез, психическая лабильность, запоры, отеки, головная боль/мигрень);
- нарушений менструального цикла.

Если симптомы сохраняются или повторяются периодически, или появляются симптомы неясного происхождения, следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Предостережения и меры предосторожности

Пациентки, имеющие в анамнезе диагноз эстроген-чувствительная опухоль должны перед приемом препарата предварительно проконсультироваться с врачом.

Пациентки, принимающие допаминовые агонисты, допаминовые антагонисты, эстрогены и антиэстрогены должны перед приемом препарата предварительно проконсультироваться с врачом.

Мастодинон® не назначается детям и подросткам младше 18 лет.

Мастодинон® не должен назначаться до наступления регулярных менструаций в период полового созревания.

Если во время приема наблюдается ухудшение симптоматики, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Данное лекарственное средство содержит 47-53% этанола в объемном отношении.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В связи с возможными допаминергическими и эстрогенергическими эффектами Vitex agnus castus, взаимодействие с допаминовыми агонистами, допаминовыми антагонистами, эстрогенами и антиэстрогенами не может быть исключено.

Применение в период беременности и кормления грудью

Мастодинон® не назначается во время беременности. Данные исследований показывают, что Vitex agnus castus может влиять на лактацию.

Мастодинон® капли противопоказан к применению в период беременности и кормления грудью.

Влияния на способность управлять автомобилем или механизмами

Исследования о влиянии лекарственного средства на способность управлять автомобилем или механизмами не проводились.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Способ применения и дозы

Внутрь. Если врачом не предписано иное, следует принимать по 30 капель 2 раза в день утром и вечером, немного разбавляя их водой или другой жидкостью.

Гомеопатические препараты не следует принимать длительное время без консультации врача

Побочное действие

Сообщалось об острых аллергических реакциях с отеком лица, одышкой, затруднением глотания. Аллергические кожные реакции (сыпь, крапивница), головная боль, головокружение, гастроинтестинальные расстройства (тошнота, абдоминальные боли), акне, нарушения менструального цикла возможны. Частота не известна.

В случае первых признаков аллергической реакции прекратить применение капель Мастодинон®.

При появлении побочного действия, не описанного в данной инструкции, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Примечание:

На фоне применения гомеопатических средств возможно временное обострение симптоматики (гомеопатическое обострение). В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата описаны не были.

В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

Срок годности

Срок годности указан на упаковке.

Открытые флаконы можно использовать в течение 6 месяцев.

Не применять после окончания срока годности!

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска

Флаконы темного стекла с дозирующим устройством по 50 мл и 100 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению помещаются в складную картонную коробку.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача