

## Листок-вкладыш - информация для пациента

### Ацилакт, суппозитории вагинальные

Действующие вещества: живые лактобактерии ацидофильные не менее  $10^7$  КОЕ

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

#### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ацилакт, суппозитории, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ацилакт, суппозитории.
3. Применение препарата Ацилакт, суппозитории.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ацилакт, суппозитории.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### 1. Что из себя представляет препарат Ацилакт суппозитории, и для чего его применяют

Препарат Ацилакт суппозитории в качестве действующего вещества содержит живые лактобактерии *Lactobacillus acidophilus*.

Препарат Ацилакт суппозитории, представляет собой микробную массу живых лактобактерий ацидофильных, антагонистически активных штаммов *Lactobacillus acidophilus 100aи, NK1, K3Ш24*, лиофилизированную с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды и сформированную в вагинальные суппозитории.

Препарат Ацилакт, суппозитории обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая стафилококки, энтеропатогенные кишечные палочки, протеи, что определяет корректирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза женских гениталий.

#### Показания к применению

Препарат Ацилакт, суппозитории применяется у взрослых от 18 лет для нормализации влагалищного микробиоценоза в комплексном лечении неспецифических воспалительных процессов влагалища, таких как:

- неспецифические кольпиты. Назначают как самостоятельное средство или после окончания курса антибактериальной терапии;

- дисбиозы влагалища, в том числе бактериальный вагиноз. Назначают как самостоятельное средство или в комплексной терапии;
- подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы. Назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации;
- гормонально-зависимые кольпиты, сенильные и др. Назначают как самостоятельное средство или на фоне специфической гормональной терапии;
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- предродовая подготовка беременных группы риска по развитию воспалительных заболеваний с целью профилактики и лечения дисбиоза влагалища;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании и после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии при лечении урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др.);

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## 2. О чем следует знать перед применением препарата Ацилакт, суппозитории

### Противопоказания

Не применяйте Ацилакт, суппозитории, если:

- у Вас аллергия на лактобактерии ацидофильные или любые из компонентов препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- у Вас есть симптомы вульвовагинального кандидоза (молочницы).

### Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ацилакт, суппозитории проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### Дети и подростки

Препарат Ацилакт, суппозитории вагинальные не рекомендуется для применения у детей и подростков до 18 лет.

### Другие препараты и Ацилакт, суппозитории

Сообщите вашему лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Применение Ацилакт суппозиторииев возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

Не рекомендуется одновременное вагинальное применение антибактериальных препаратов с Ацилакт суппозиториями. Это может привести к снижению его эффективности.

### Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Ацилакт суппозитории разрешен для применения женщинам в период беременности и грудного вскармливания.

### Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Ацилакт суппозитории не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### 3. Применение препарата Ацилакт суппозитории

Всегда применяйте препарат Ацилакт, суппозитории в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### Рекомендуемая доза:

- При лечении сенильных вагинитов гормональной природы и дисбиозов влагалища препарат применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.
- При нарушении чистоты вагинального секрета у беременных до III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.
- С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.
- С целью восстановительной терапии после применения антибиотиков применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней.

Курс повторяют по назначению врача через 10-20 дней.

#### Применение у детей и подростков

Применение препарата Ацилакт, суппозитории вагинальные не рекомендуется у детей и подростков до 18 лет.

#### Путь или способ введения

Ацилакт, суппозитории применяют вагинально.

Перед интравагинальным введением с суппозитория удаляют упаковочный материал.

#### Если Вы применили препарата Ацилакт, суппозитории больше, чем следовало

Случаи передозировки не зарегистрированы.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

#### Если Вы забыли применить препарат Ацилакт, суппозитории

В случае пропуска приема препарата в нужное время, примените его, как только вспомните об этом, а затем продолжайте применение препарата как обычно.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу препарата.

#### Если Вы прекратили применение препарата Ацилакт, суппозитории

Препарат Ацилакт, суппозитории необходимо регулярно применять для достижения полного терапевтического эффекта.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Ацилакт, суппозитории может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции при применении препарата не установлены.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

6470 - 2018

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Республика Беларусь**

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Товарищеский пер., 2а, 220037, г. Минск

Телефон/факс: +375 17 242-00-29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт: [www.rceth.by](http://www.rceth.by)

**5. Хранение препарата Ацилакт, суппозитории**

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке.

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Срок годности – 2 года. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Препарат не пригоден для применения:

- с истекшим сроком годности;
- без маркировки;
- целостность упаковки которого нарушена;
- с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появление запаха прогорклого жира, деформация суппозитория).

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

**6. Содержимое упаковки и прочие сведения****Препарат Ацилакт, суппозитории содержит**

Действующим веществом являются живые лактобактерии ацидофильные *Lactobacillus acidophilus* штаммы 100аш, НК<sub>1</sub> и К<sub>3</sub>Ш<sub>24</sub>. Каждый суппозиторий содержит не менее 10<sup>7</sup> КОЕ живых лактобактерий ацидофильных.

Прочими (вспомогательными) веществами являются: жир кондитерский растительный (заменитель масла какао), парафин нефтяной твердый, эмульгатор Т-2.

**Внешний вид препарата Ацилакт, суппозитории и содержимое упаковки**

Ацилакт, суппозитории вагинальные.

Суппозитории желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, конусообразной, торпедообразной или цилиндрической формы; допускается специфический запах жира и неоднородность цвета в виде вкраплений или «мраморности», возможно окрашивание кончика суппозитория от бледно-желтого до светло-коричневого цвета.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной белого цвета. По 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем).

6470 - 2018

**Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Россия, АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, проезд Бумажный, д. 14 стр. 1, этаж 6, ком. 7. Тел.: +7(499) 257-10-90.

Адрес производства:

Россия, 152023, Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38;

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38, стр. 3.

**За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

Республика Беларусь

ООО «ИЛПО»,

220013, г. Минск, ул. 2-ая Шестая Линия, 9, к.7.

Тел. +375 29 659-42-51

**Все претензии потребителей следует направлять держателю регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

АО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»,

127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, этаж 6, ком. 7.

Тел. +7(499) 257-10-90.

Эл. почта: [nadzor@vitafarma.ru](mailto:nadzor@vitafarma.ru)

**Листок-вкладыш пересмотрен****Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: <https://rceth.by>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации), сайт уполномоченного органа <https://rceth.by>.