


Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

РОМАШКИ ЦВЕТКИ
CHAMOMILLAE FLORES

Форма выпуска Цельное сырье. **Регистрационный номер** _____

Форма выпуска Измельченное сырье. **Регистрационный номер** _____

Общая характеристика

Ромашки цветки содержат эфирное масло, флавоноиды, кумарины, органические кислоты, полисахариды, горечи и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Фармакологические свойства

Средство растительного происхождения. По результатам экспериментальных исследований оказывает противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие, способствует заживлению ран.

Показания к применению

Внутрь: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения нетяжелых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (метеоризм, легкие болевые ощущения спастического характера).

Местно: для полосканий в комплексной терапии нетяжелых воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Наружно: в составе комплексной терапии для симптоматического лечения воспалительных заболеваний кожи и воспалительных процессов в аногенитальной области после консультации врача.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Гиперчувствительность к ромашке, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема.

Способ применения и дозы

Для цельного и измельченного сырья. 5 г (2 столовых ложки измельченного сырья или 2,5 столовых ложки цельного сырья) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) водой комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают в водяной бане при частом помешивании в течение 15 мин, затем охлаждают при комнатной температуре не менее 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1/4-1/2 стакана 3-4 раза в день.

Для приема внутрь применяется у детей старше 6 месяцев после консультации врача. Для приема настоя внутрь по назначению врача: детям от 6 месяцев до 2 лет - по 1-2 чайные ложки 2-4 раза в день, детям от 2 до 6 лет - по 1-2 столовые ложки 2-4 раза в день, детям от 6 до 12 лет - по 1/4 стакана 2-4 раза в день.

Местно и наружно взрослым и детям старше 12 лет применять для полосканий (по 1/2-1 стакану настоя 3-5 раза в день), орошений, примочек.

Взрослым и детям старше 12 лет применять для клизм и микроклизм, спринцеваний, при необходимости для одной процедуры настой довести кипяченой водой до 1 литра. Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Возможны реакции гиперчувствительности, включая тяжелые аллергические реакции после нанесения препаратов цветков ромашки на слизистые оболочки (нарушение дыхания, ангионевротический отек, сосудистый коллапс, анафилактический шок). Частота не известна. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение в период беременности и лактации Применение во время беременности и лактации по назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Женщинам во время беременности и лактации перед применением лекарственного средства необходима консультация врача. В случае наружного применения необходимо удалить лекарственное средство с молочной железы женщины, кормящей грудью, перед кормлением, чтобы предотвратить сенсibilизацию ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами Исследования не проводились.

Применение у детей Для приема внутрь применяется у детей старше 6 месяцев после консультации врача (см. раздел «Способ применения и дозы»). Для приема внутрь не применять у детей до 6 месяцев. Для местного и наружного применения не рекомендуется для детей до 12 лет.

Передозировка Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами Исследования не проводились. Получены сообщения о взаимодействиях, основанных на воздействии на СУР450 у пациентов после трансплантации почки, принимавших высокие дозы препаратов цветков ромашки в течение длительного времени (около двух месяцев).

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Цветки ромашки хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Приготовленные настои хранить не более 2 суток при температуре (8-15) °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 2 года.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

Цельное сырье. По 40,0 г в пакете бумажном в пачке картонной. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Измельченное сырье. По 40,0 г в пакете бумажном в пачке картонной. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.

