

Листок-вкладыш – информация для потребителя
ЭМОКСИПИН,
раствор (капли глазные) 10 мг/мл
Действующее вещество: метилэтилпиридинола гидрохлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ЭМОКСИПИН, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ЭМОКСИПИН.
3. Применение препарата ЭМОКСИПИН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЭМОКСИПИН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат ЭМОКСИПИН,
и для чего его применяют**

Препарат ЭМОКСИПИН является ангиопротектором, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, является ингибитором свободнорадикальных процессов, уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов. Обладает ретинопротекторными свойствами, способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний и улучшению микроциркуляции глаза.

Глазные капли ЭМОКСИПИН применяют:

- для лечения кровоизлияния в передней камере глаза;
- для лечения и профилактики кровоизлияния в склере у лиц пожилого возраста;
- для лечения и профилактики воспаления и ожогов роговицы;
- для лечения осложнений при близорукости;
- для лечения осложнений при ношении контактных линз.

2. О чем следует знать перед применением препарата ЭМОКСИПИН

Не применяйте данный препарат, если:

- у Вас повышенная чувствительность к метилэтилпиридинола гидрохлориду или любому вспомогательному компоненту препарата (см. раздел 6);
- Вы беременны.

С осторожностью: в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ЭМОКСИПИН проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- Вам необходимо одновременно использовать ~~другие~~ **офтальмологические** лекарственные препараты (глазные капли и другие). Интервал между применением ЭМОКСИПИН и других препаратов должен составлять не менее 15 минут. ЭМОКСИПИН следует применять последним.

Любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием препарата и надевать не ранее чем через 20 мин после него.

Важная информация о вспомогательных веществах

Препарат ЭМОКСИПИН содержит натрия бензоат Е 211. Может слабо раздражать кожу, глаза и слизистые оболочки.

Дети и подростки

Применение лекарственного препарата не рекомендовано у детей и подростков до 18 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

Другие препараты и препарат ЭМОКСИПИН

Негативных проявлений при применении ЭМОКСИПИН на фоне терапии другими лекарственными препаратами не описано. Однако сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

ЭМОКСИПИН не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность: применение противопоказано.

Лактация: применение возможно только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Воздержитесь от управления автотранспортом в течение 15-20 минут после применения лекарственного препарата, поскольку ЭМОКСИПИН может вызвать кратковременное чувство жжения и зуда.

3. Применение препарата ЭМОКСИПИН

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Врач определит длительность лечения в зависимости от тяжести заболевания (обычно составляет 3-30 дней). При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев. При необходимости повторные курсы лечения проводятся с интервалом 4-6 месяцев.

Препарат применяется местно в виде инстилляций в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза в день.

Рекомендации по использованию флаконов в комплекте с крышкой-капельницей
Перед применением внимательно прочтите этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достать из упаковки флакон.
2. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым: расположить ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снять алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).
3. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым с пластиковой накладкой: с усилием потянуть за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее вертикально, затем резко потянуть вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снять алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).

4. Достать капельницу из упаковки и плотно надеть ее на флакон (рис. 3).
5. Перевернуть флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождать несколько секунд. В случае большого пузырька вернуть флакон в исходное положение, а затем медленно повторить действие, аккуратно постучав по дну флакона (рис. 4).
6. Закапать капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5). Нельзя прикасаться пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.
7. Перевернув флакон, закрыть пипетку специальной пробкой (рис. 6).

А



Б




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

После закапывания глазных капель рекомендуется закрыть глаза ватным тампоном. Не открывая глаз, прижмите внутренний угол глаза на 1-2 минуты.

Если Вы применили препарата ЭМОКСИПИН больше, чем следовало

Если Вы считаете, что закапали слишком большую дозу препарата, промойте глаза водой или физиологическим раствором и при необходимости обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить препарат ЭМОКСИПИН

Если Вы забыли закапать глазные капли, сделайте это при первой возможности. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы пропустили несколько доз, сообщите об этом врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам ЭМОКСИПИН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата может возникнуть чувство жжения, зуд, кратковременное покраснение конъюнктивы (тонкая прозрачная ткань, покрывающая глаз снаружи и заднюю поверхность век), уплотнение параорбитальных тканей (ткани вокруг глаз), аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Вы также можете сообщить о нежелательных ~~реакциях~~ в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ЭМОКСИПИН

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C в течение 4 недель.

Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Один флакон содержит действующее вещество – метилэтилпиридинола гидрохлорид – 10 мг/мл;

вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный Е 221, натрия бензоат Е 211, калия дигидрофосфат, динатрия фосфат дигидрат, вода для инъекций.

Внешний вид препарата ЭМОКСИПИН и содержимое упаковки

ЭМОКСИПИН, раствор (капли глазные) 10 мг/мл, – прозрачный бесцветный или с желтоватым оттенком раствор.

По 5 мл во флаконы, укупоренные пробками резиновыми и колпачками алюминиевыми или алюминиевыми с пластиковой накладкой. На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. Флакон в комплекте с крышкой-капельницей и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс:(+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com

Листок-вкладыш пересмотрен:

