

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
**по применению лекарственного средства**  
**Таблетки от кашля с термопсисом, таблетки 6,7 мг/250 мг**  
(информация для пациента)

**Прочитайте внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!**

*Внимательно прочитайте весь Листок-вкладыш перед тем, как начать приём/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию. Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше (инструкции).*

*Сохраните этот Листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

*Этот препарат предназначен лично для Вас и не следует передавать его другим лицам. Это может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.*

**Торговое название:** Таблетки от кашля с термопсисом, таблетки 6,7 мг/250 мг.

**Международное непатентованное название:** нет.

**Форма выпуска:** таблетки.

**Описание:** таблетки круглые, двояковыпуклые зеленовато-серого цвета. Допускается наличие вкраплений.


**Состав на 1 таблетку:**

*Действующие вещества:*

Термопсиса ланцетного трава – 6,7 мг

Натрия гидрокарбонат – 250,0 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, повидон К-25, магния стеарат.



**Фармакотерапевтическая группа:** препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие препараты. Комбинированные препараты.

Код АТХ: R05CA10.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В составе комплексной терапии заболевания дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь. Взрослым назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Курс лечения в течение 3-5 дней.

Необходимость назначения повторного курса определяется врачом.

*Если при использовании лекарственного средства симптомы сохраняются, или происходит ухудшение состояния, или развилось затруднение дыхания, поднялась температура или появилась гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.*

### ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции, тошнота.

*Если любые указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом Вашему врачу.*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

Не следует назначать препарат при легочных заболеваниях со склонностью к кровохарканию (рак и туберкулез легких при наличии кровотечения).

## ПЕРЕДОЗИРОВКА

*Симптомы:* тошнота, рвота.

*Лечение:* промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется назначить обильное теплое питье.

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,0232 г углеводов (0,0019 ХЕ).

Если во время приёма лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (появляются нарушения дыхания, поднимается температура, появляется гнойная мокрота или другие симптомы), необходимо обратиться к врачу.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

## ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Таблетки от кашля с термопсисом не влияют на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов, входящих в состав травы термопсиса, в желудочно-кишечном тракте.

Таблетки от кашля с термопсисом не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отделение разжиженной мокроты.

*Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!*

**Условия хранения:** хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не применять лекарственное средство по истечении срока годности.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Упаковка:** по 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. По 30 таблеток в банке полимерной с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия, уплотнительное средство – вата медицинская. Одну банку, 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 20 таблеток или 3 контурных ячейковых упаковки по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают во вторичную упаковку из картона коробочного.

## Информация о производителе:

«Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд» (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь,

г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3; тел/факс (017) 373-30-90

**УТВЕРЖДЕНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

НД РБ

28825-2020