

Листок-вкладыш – информация для потребителя

КАГОЦЕЛ®**12 мг, таблетки****Кагоцел**

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если у Вас возникли какие-либо побочные эффекты, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные побочные эффекты, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Кагоцел, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Кагоцел
3. Прием препарата Кагоцел
4. Возможные побочные эффекты
5. Хранение препарата Кагоцел
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Кагоцел и для чего его применяют

Кагоцел относится к противовирусным препаратам. Он стимулирует продукцию

интерферонов, обеспечивающих иммунную защиту от вирусных инфекций.

Препарат Кагоцел применяют у взрослых и детей в возрасте от 3 лет для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также для лечения герпеса у взрослых.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Кагоцел

Не принимайте препарат Кагоцел:

- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если у Вас есть повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- если у Вас есть дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Если вы не уверены в том, стоит ли начинать прием препарата Кагоцел, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Особые указания и меры предосторожности

- Для достижения лечебного эффекта начинайте прием препарата не позднее четвертого дня от начала заболевания.

Дети

- Препарат Кагоцел не предназначен для приема детям в возрасте до 3 лет.
- В связи с незрелостью глотательного рефлекса у детей младше 6-летнего возраста могут возникать трудности при проглатывании таблеток, что связано с повышенным риском попадания таблетки в дыхательные пути. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и соблюдать меры осторожности при использовании таблеток Кагоцел у детей младше 6 лет.

Применение других лекарств

- Препарат Кагоцел хорошо сочетается с другими противовирусными препаратами, иммуномодуляторами и антибиотиками, усиливая их действие (аддитивный эффект).

Беременность и грудное вскармливание

- Препарат Кагоцел не следует применять при беременности и грудном вскармливании.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

- Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами, механизмами не изучено.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

- Препарат Кагоцел содержит лактозу. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Кагоцел

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемые дозы

- **Лечение гриппа и ОРВИ у взрослых**

В первые два дня – по 2 таблетки 3 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 3 раза в день. Всего на курс – 18 таблеток, длительность курса – 4 дня.

- **Профилактика гриппа и ОРВИ у взрослых**

Проводится 7-дневными циклами: два дня – по 2 таблетки 1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев.

- **Лечение герпеса у взрослых**

По 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней. Всего на курс – 30 таблеток, длительность курса – 5 дней.

- **Лечение гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 3 до 6 лет**

В первые два дня – по 1 таблетке 2 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 1 раз в день. Всего на курс – 6 таблеток, длительность курса – 4 дня.



- **Лечение гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 6 лет**

В первые два дня – по 1 таблетке 3 раза в день, в последующие два дня – по одной таблетке 2 раза в день. Всего на курс – 10 таблеток, длительность курса – 4 дня.

- **Профилактика гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 3 лет**

Проводится 7-дневными циклами: два дня – по 1 таблетке 1 раз в день, 5 дней перерыв, затем цикл повторить. Длительность профилактического курса – от одной недели до нескольких месяцев.

Способ введения

Для приема внутрь.

Если Вы приняли препарата Кагоцел больше, чем следовало,

Примите большое количество жидкости, вызовите рвоту, после чего обратитесь за консультацией к врачу.

Если Вы забыли принять препарат Кагоцел

Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы восполнить пропущенную дозу. Продолжите прием препарата в соответствии с прежней схемой.

Если Вы прекратите прием препарата Кагоцел

Не существует вредных последствий в случае прекращения приема препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные побочные эффекты

Подобно всем лекарственным препаратам, Кагоцел может вызывать побочные эффекты, однако они возникают не у всех.

Сообщите лечащему врачу, если вы заметили у себя и обеспокоены чем-либо из перечисленного:

- сыпь,



- крапивница,
- зуд кожи,
- отек Квинке,
- тошнота,
- частый жидкий стул,
- боль в области желудка.

Частота перечисленных выше нежелательных реакций неизвестна (по имеющимся данным определить частоту не представляется возможным).

Сообщение о побочных эффектах

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Россия

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

125252, г. Москва, улица Авиаконструктора Микояна, дом 12, этаж 2, помещение №II,
комната 26

Телефон/факс: +7 (495) 385-80-08

Электронная почта: safety@nearmedic.ru

5. Хранение препарата Кагоцел

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните препарат в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке, или если упаковка порвана или имеет признаки ее повреждения.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Кагоцел содержит

Действующее вещество кагоцел 12 мг (в пересчёте на сухое вещество).

Вспомогательными веществами являются крахмал картофельный, кальция стеарат, Лудипресс (состав: лактозы моногидрат, повидон (Коллидон 30), кросповидон (Коллидон CL)).

Внешний вид препарата Кагоцел и содержимое упаковки

Препарат Кагоцел – таблетки от белого с коричневатым оттенком до светло-коричневого цвета круглые двояковыпуклые с вкраплениями коричневого цвета.

Препарат выпускается в блистерах, по 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ/ПВДХ (поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной) и алюминиевой фольги. По 1, 2 или 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) помещают в пачку картонную.

Порядок розничной реализации препарата

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного удостоверения:

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»


Россия, 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, этаж 2, помещение №II, комната 26.

Тел./факс: +7 (495) 741-49-89

Электронная почта: info@nearmedic.ru

НД РБ

7079 - 2019



Производитель

ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»

Россия, 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, оф. 402.

Адрес места производства: Россия, 249030, Калужская область, г.о. «Город Обнинск», г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 120, корп. 3, 4, 5.

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Россия

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Тел./факс: +7 (495) 385-80-08

Электронная почта: safety@nearmedic.ru

Листок-вкладыш пересмотрен 02.2021.

Генеральный директор
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»



В.Г. Нестеренко