

## **Будикорт®**, суспензия для небулайзера

Будесонид

### **Форма выпуска**

Будикорт®, суспензия для небулайзера 0,25 мг: Каждая ампула объемом 2 мл содержит 0,25 мг будесонида (Брит. Фарм.).

Будикорт®, суспензия для небулайзера 0,5 мг: Каждая ампула объемом 2 мл содержит 0,5 мг будесонида (Брит. Фарм.).

### **Описание**

Будесонид представляет собой синтетический кортикостероид, обладающий мощной глюкокортикоидной активностью и слабой минералокортикоидной активностью. Он имеет примерно в 200 раз более высокое сродство к глюкокортикоидным рецепторам и в 1000 раз более высокую местную противовоспалительную активность, чем кортизол. Было установлено, что кортикостероиды обладают широким спектром ингибирующей активности в отношении нескольких типов клеток (например, тучных клеток, эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов и лимфоцитов) и медиаторов (например, гистамина, эйкозаноидов, лейкотриенов и цитокинов), участвующих в воспалении, обусловленном аллергией.

### **Показания к применению**

Препарат Будикорт, суспензия для небулайзера показан для поддерживающей терапии и профилактической терапии бронхиальной астмы.

### **Способ применения и дозы**

Начальная доза

*Дети от 3 месяцев до 12 лет:* 0,5–1 мг два раза в сутки.

*Взрослые и пожилые пациенты:* 1–2 мг два раза в сутки.

*Поддерживающая доза:* половина вышеуказанных доз.

### **Нежелательные реакции**

Среди частых нежелательных реакций регистрировались чихание, головная боль, боль в горле, сухость во рту, тошнота и другие.

### **Меры предосторожности**

Препарат Будесонид, суспензия для небулайзера следует применять с осторожностью у пациентов с активной или латентной фазой туберкулезной инфекции, нелечеными грибковыми, бактериальными или системными вирусными инфекциями, или глазной инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к любому из компонентов данного препарата.

### **Использование при беременности и кормлении грудью**

*Беременность.* Адекватные и хорошо контролируемые исследования с участием беременных женщин не проводились. Препарат Будесонид, суспензия для небулайзера, как и другие кортикостероиды, следует принимать во время беременности только в том случае, если потенциальная польза превышает потенциальный риск для плода.

*Кормление грудью.* Неизвестно, выделяется ли будесонид с грудным молоком. Поскольку другие кортикостероиды выделяются с грудным молоком, следует соблюдать осторожность при назначении препарата Будесонид, суспензия для небулайзера кормящим женщинам.

## **Лекарственное взаимодействие**

О существенных лекарственных взаимодействиях не сообщалось.

## **Хранение**

- 1) Хранить при температуре не выше 30 °С, но не замораживать.
- 2) Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от света.

## **Коммерческая упаковка**

Будикорт<sup>®</sup>, суспензия для небулайзера 0,25 мг: каждая пачка содержит 5 ампул по 2 мл.

Будикорт<sup>®</sup>, суспензия для небулайзера 0,5 мг: каждая пачка содержит 10 ампул по 2 мл.

Произведено компанией

**Incepta Pharmaceuticals Ltd.**

Savar, Dhaka, Bangladesh (Бангладеш)

® Зарегистрированный торговый знак

Ред. 03

BD1