

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БЕЛЛАСТЕЗИН

наименование лекарственного препарата

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- Сохраняйте инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Регистрационный номер: ЛП-002114

Торговое наименование: Белластезин

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Белладонны листья экстракт+Бензокаин

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активные компоненты/

Анестезин (бензокаин) -0,300 г

Крапивы экстракт густой -0,015 г

Вспомогательные вещества

Целлюлоза микрокристаллическая -0,035417 г

Оксипропилидолоза (гипролоза) -0,008510 г

Кроскармеллоза натрия -0,003691 г

Тальк -0,003691 г

Кальция стеарат -0,003691 г

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными включениями.

Фармакотерапевтическая группа

Спазмолитическое средство.

Код АТХ

[A03ED]

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат.

Оказывает спазмолитическое, местноанестезирующее и анальгезирующее действие; снижает кислотность желудочного сока, тонус гладкомышечных клеток органов желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повышенной секреторной функцией желудка и спазмами гладкой мускулатуры с целью купирования болевого синдрома (гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома, гипергиперстатическая желчесть, детский возраст.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью

Большим с полинейропатией, гипертиреозом, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, заболеваниями почек, диафрагмальной грыжей, рефлюкс-эзофагитом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением препарата Белластезин, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Беременным следует применять только в случае, когда, по мнению врача, польза для матери при применении лекарственного препарата превосходит потенциальный риск для плода. В случае применения женщинами кормящими

грудью, трудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день. Таблетку глотают не разжевывая и запивают водой. Курс лечения подбирают индивидуально.

Если симптомы заболевания не проходят в течение 3-5 дней, необходимо обратиться к врачу для решения вопроса о дальнейшем применении препарата.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны: сухость во рту, потеря вкуса, аппетита, мидриаз (расширение зрачков), сонливость, головокружение, тахикардия, нарушение речи, возбуждение (особенно у пожилых пациентов), парез accommodation, аллергические реакции, затруднение мочеиспускания, запор.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат снижает антибактериальную активность сульфаниламидов. Амантадин и хинолин усиливают эффект препарата. При одновременном применении препарата с оплодородными анальгетиками и препаратами, угнетающими центральную нервную систему, возможно угнетение центральной нервной системы; с гипотензивными и органическими нитратами – повышается внутриглазное давление; с глюкокортико-стероидами для системного применения – снижается их эффект и возможно повышение внутриглазного давления; с М-холинблокадерами – усиливается антихолинэргический эффект; с флуоресцидом – возможна ортостатическая гипотензия.

Резерпин, ингибиторы моноаминоксидазы, гуанетидин, антацидные средства, аскорбиновая кислота, аттагулит снижают эффект препарата.

При одновременном применении препарата с антигистаминными препаратами усиливается антигистаминный эффект; с блокаторами бета-адренорецепторов – снижается их эффект; с тормозными контрацептивами – снижается контрацептивный эффект; с неселективными ингибиторами обратного нейронального захвата моноаминов – усиливается седативный эффект. Препарат снижает эффект нестероидных противовоспалительных препаратов, тризольфана, дигитоксина, доксициклина, кетоконазола, метоклопрамида, метронидазола, повышает эффект индальмида, низатидина.

При одновременном применении с препаратами, содержащими калий, возможно образование язв в кишечнике.

Особые указания

Недопустимо использование для снятия острых болей в животе (до выяснения причины).

Следует избегать применения препарата лицам, деятельность которых требует повышенной остроты зрения.

Внимание на способность управлять транспортными средствами, механизмами

При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятой другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

50, 100 или 200 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку или в видик из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корт. 6А, корт. 67, зд. 90.