

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь


Б. Н. Андросюк
« 20 » 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению
изделия медицинского назначения
ЛАКТАЦИД
суппозитории вагинальные

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
УП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»


М. И. Злотникова
« 14 » 2023 г.




СОГЛАСОВАНО
Ректор
Учреждения образования «Витебский
государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет»


« 20 » 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО «Рубикон»


И. С. Лобковский
« 20 » 2023 г.



СОГЛАСОВАНО
Главный врач
УЗ «Городенский областной
клинический перинатальный центр»


В. Л. Зверко
« 20 » 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению
изделия медицинского назначения
ЛАКТАЦИД
суппозитории вагинальные

Состав на один суппозиторий

Молочная кислота – 100 мг (в пересчете на 100% вещество);

Макрогол 400 – 60 мг;

Макрогол 1500 – до 3000 мг.

Описание изделия

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Показания к применению

Вагинальные суппозитории «Лактацид» предназначены для местного применения, интравагинально, с целью нормализации нарушенной микрофлоры рН влагалища, в том числе при бактериальном вагинозе (в составе комплексной терапии).

Молочная кислота является продуктом жизнедеятельности молочнокислых бактерий влагалища и является главным компонентом влагалищного секрета. Молочная кислота создает оптимальные условия для роста и развития нормальной микрофлоры влагалища, способствует повышению естественной защиты влагалища от инфекций.

Способ применения и дозы

Перед введением суппозитория необходимо тщательно вымыть руки, суппозиторий извлечь из контурной упаковки и ввести во влагалище в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах.

Один вагинальный суппозиторий вводят во влагалище один раз в сутки в течение 10 дней.

Особые указания

Суппозитории предназначены только для вагинального применения!

Не глотать!

Учитывая тот факт, что молочная кислота является промежуточным продуктом метаболизма млекопитающих и в норме содержится в организме человека, в т.ч. в околоплодных водах, грудном молоке, применение изделия медицинского назначения «Лактацид» в период беременности и грудного вскармливания возможно после консультации с врачом.

Меры предосторожности

Не применять при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов изделия медицинского назначения.

При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции влагалища.

Если после применения суппозитория произошло усиление неблагоприятных ощущений во влагалище или другие не наблюдавшиеся ранее симптомы и проявления на наружных половых органах, следует прекратить их использование и обратиться за консультацией к врачу.

Не следует использовать суппозитории при нарушении целостности упаковки.

Противопоказания

- кандидозный вульвовагинит;

- дети и подростки (до 18 лет).

Содержимое упаковки

5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

2 года.

Не применяйте изделие медицинского назначения после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел. +375 (212) 36-47-77
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, e-mail: secretar@rubikon.by

