



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

Нексиум,**20 мг, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: эзомепразол

Перед приемом препарата внимательно полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

- Что из себя представляет препарат Нексиум, и для чего его применяют.
- О чем следует знать перед приемом препарата Нексиум.
- Как принимать препарат Нексиум.
- Возможные нежелательные реакции.
- Хранение препарата Нексиум.
- Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Нексиум, и для чего его применяют.

Лекарственный препарат Нексиум содержит действующее вещество: эзомепразол. Он принадлежит к группе лекарственных препаратов, называемых «ингибиторами протонной помпы». Данные лекарственные препараты уменьшают количество кислоты, образующейся в желудке человека.

Лекарственный препарат Нексиум применяется для лечения следующих состояний:

У взрослых пациентов:

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этой патологии происходит заброс кислоты из желудка в пищевод (полую трубку, соединяющую глотку с желудком), что приводит к развитию болевых ощущений, воспаления и изжоги.
- Язва желудка или верхнего отдела кишечника, вызванная бактериями, называемыми *«Helicobacter pylori»*. Если у вас наблюдается данная патология, лечащий врач может дополнительно назначить антибиотики для лечения инфекции и заживления язвы.

- Язва желудка, вызванная приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Лекарственный препарат Нексиум может применяться для предотвращения развития язвы желудка, если вы принимаете НПВП.
- Избыточное количество кислоты в желудке, вызванное опухолью поджелудочной железы (синдром Золлингера-Эллисона).
- Длительное лечение после внутривенного введения лекарственного препарата Нексиум с целью профилактики повторного кровотечения из язвы.

У подростков в возрасте от 12 лет и старше:

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этой патологии происходит заброс кислоты из желудка в пищевод (полую трубку, соединяющую глотку с желудком), что приводит к развитию болевых ощущений, воспаления и изжоги.
- Язва желудка или верхнего отдела кишечника, вызванная бактериями, называемыми «*Helicobacter pylori*». Если у вас наблюдается данная патология, лечащий врач может дополнительно назначить антибиотики для лечения инфекции и заживления язвы.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Нексиум.

Не принимайте лекарственный препарат Нексиум, если:

- у вас повышенная чувствительность (аллергия) к действующему веществу (эзомепразол), либо к вспомогательным веществам данного лекарственного препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша).
- у вас аллергия на другие ингибиторы протонной помпы (например, пантопразол, лансопразол, рабепразол, омепразол).
- вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).

Не принимайте лекарственный препарат Нексиум в вышеперечисленных случаях. Если вы не уверены, относится ли к вам приведенная выше информация, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки перед началом приема препарата Нексиум.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки перед началом приема лекарственного препарата Нексиум в следующих случаях:

- Если у вас тяжелые заболевания печени.
- Если у вас тяжелые заболевания почек.
- Если у вас когда-либо наблюдалась кожная реакция после приема лекарственного препарата, аналогичного лекарственному препаратору Нексиум, т.е. препарата, который уменьшает количество кислоты, образующейся в желудке.
- Если вам предстоит выполнить специфический анализ крови (Хромогранин А).

Прием лекарственного препарата Нексиум может маскировать симптомы других заболеваний. Поэтому, если у вас наблюдается любой из перечисленных ниже симптомов до начала приема или во время приема лекарственного препарата Нексиум, немедленно проконсультируйтесь с лечащим врачом:

- У вас наблюдается существенная потеря веса без явной причины, и вы испытываете проблемы при глотании.
- Вы чувствуете боль в животе, или у вас нарушение пищеварения.
- У вас рвота или рвота с кровью.
- Ваш кал окрашен в черный цвет (примесь крови в кале).

Если вы принимаете лекарственный препарат Нексиум «по требованию», но при этом симптомы вашего заболевания сохраняются или характер симптомов изменяется, вам следует обратиться к врачу.

Применение ингибитора протонной помпы, например, лекарственного препарата Нексиум, особенно в течение длительного периода времени (более одного года), может привести к некоторому увеличению риска перелома бедра, запястья или позвоночника. Сообщите лечащему врачу, если у вас остеопороз, или если вы принимаете кортикостероиды (прием кортикостероидов может увеличить риск развития остеопороза).

Сыпь и кожные симптомы

В случае появления сыпи на коже, в особенности на участках кожи, подверженных воздействию солнечного света, сообщите об этом лечащему врачу как можно скорее, так как вам может потребоваться прекратить прием лекарственного препарата Нексиум. Проинформируйте лечащего врача о возникновении любых других болевых ощущений, например, боли в суставах. У пациентов, принимавших эзомепразол, возникали серьезные кожные высыпания (см. также раздел 4). Сыпь может включать язвы во рту, горле, носу, гениталиях и конъюнктивит (покраснение и отек глаз). Эти серьезные кожные высыпания часто появляются после гриппоподобных симптомов, таких как лихорадка, головная боль, боль в теле. Сыпь может покрывать большие участки тела с образованием пузьрей и шелушением кожи.

Если в какой-либо момент лечения (даже через несколько недель) у вас появится сыпь или любой из таких кожных симптомов, прекратите принимать данный препарат и немедленно обратитесь к врачу.

Дети в возрасте младше 12 лет

Лекарственный препарат Нексиум в данной лекарственной форме (таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой) не рекомендован для применения у детей в возрасте младше 12 лет. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если вам потребуется дополнительная информация.

Другие лекарственные препараты и препарат Нексиум

Проинформируйте лечащего врача или работника аптеки, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать любые другие лекарственные препараты. Это предупреждение касается также лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача. Лекарственный препарат Нексиум может оказывать влияние на эффективность других лекарственных препаратов, и наоборот.

Не принимайте лекарственный препарат Нексиум, если вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).

Проинформируйте лечащего врача или работника аптеки, если вы принимаете, следующие лекарственные препараты:

- Атазанавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).
- Клопидогрел (используется для предотвращения образования тромбов).
- Кетоконазол, итраконазол или вориконазол (применяются для лечения грибковых инфекций).
- Эрлотиниб (применяется для лечения опухолевых заболеваний).
- Циталопрам, имипрамин или кломипрамин (применяются для лечения депрессии).
- Диазепам (применяется для лечения тревожных расстройств, расслабления мышц или эpileпсии).
- Фенитоин (применяется для лечения эpileпсии). Если вы принимаете фенитоин, лечащий врач должен будет наблюдать за вашим состоянием в момент начала или прекращения приема лекарственного препарата Нексиум.
- Препараты, которые используются для разжижения крови, такие как варфарин. Лечашему врачу может потребоваться наблюдение за вашим состоянием в момент начала или прекращения приема лекарственного препарата Нексиум.
- Цилостазол (применяется для лечения перемежающейся хромоты – боли в ногах при ходьбе, вызванной недостаточным кровоснабжением).
- Цизаприд (применяется при несварении желудка и изжоге).
- Дигоксин (применяется при заболеваниях сердца).
- Метотрексат (химиотерапевтический лекарственный препарат, применяется в высоких дозах для лечения онкологических заболеваний). Если вы принимаете высокую дозу метотрексата, лечащий врач может принять решение о приостановке терапии лекарственным препаратом Нексиум.
- Такролимус (применяется после трансплантации органов).
- Рифамицин (применяется для лечения туберкулеза).
- Зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*) (применяется для лечения депрессии).

Если лечащий врач назначил вам антибиотики амоксициллин и кларитромицин одновременно с лекарственным препаратом Нексиум для лечения язвы, вызванной бактерией *Helicobacter pylori*, крайне важно проинформировать врача о любых других принимаемых вами лекарственных препаратах.

Прием препарата Нексиум с пищей и напитками

Таблетки лекарственного препарата Нексиум можно принимать во время приема пищи или натощак.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если вы беременны, считаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки перед тем, как начать прием лекарственного препарата Нексиум. Лечащий врач примет решение о возможности приема лекарственного препарата Нексиум во время беременности.

Неизвестно, выделяется ли лекарственный препарат Нексиум в грудное молоко. Не принимайте данный лекарственный препарат в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Маловероятно, что лекарственный препарат Нексиум оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Однако при приеме лекарственного препарата Нексиум могут возникать такие нежелательные реакции, как головокружение и нечеткость зрения (частота возникновения – нечасто или редко, см. раздел 4). В случае развития таких нежелательных реакций вам не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Лекарственный препарат Нексиум содержит сахарозу

Лекарственный препарат Нексиум содержит сахарные шарики, которые содержат сахарозу, разновидность сахара. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем начать прием данного лекарственного препарата.

Содержание натрия

Лекарственный препарат Нексиум содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в одной таблетке, то есть практически не содержит натрия.

3. Как принимать препарат Нексиум.

Всегда применяйте лекарственный препарат Нексиум именно так, как рекомендовал лечащий врач или работник аптеки. Если вы не уверены в правильности применения лекарственного препарата, проконсультируйтесь у лечащего врача или работника аптеки.

- Если вы принимаете лекарственный препарат Нексиум в течение длительного периода времени, лечащий врач должен будет контролировать ваше состояние (особенно, если продолжительность приема лекарственного препарата составляет более года).
- Если лечащий врач назначил вам прием данного лекарственного препарата «по требованию», проинформируйте врача в случае изменения характера ваших симптомов.

Рекомендуемая доза

- Лечащий врач назначит вам необходимую дозу лекарственного препарата Нексиум и проинформирует вас о продолжительности лечения, в зависимости от вашего состояния, возраста и функции печени.
- Рекомендуемые дозы лекарственного препарата Нексиум приведены ниже.

Применение лекарственного препарата Нексиум у взрослых пациентов в возрасте 18 лет и старше

Лечение изжоги, вызванной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ):

- Если лечащий врач обнаружит у вас незначительные повреждения пищевода, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составит 40 мг один раз в сутки в течение 4 недель. Лечащий врач может порекомендовать вам продолжить прием той же дозы лекарственного препарата в течение дополнительных 4 недель, если пищевод еще не зажил.

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум после заживления пищевода составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если ваш пищевод не поврежден, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки. Как только состояние стабилизируется, врач может порекомендовать вам принимать лекарственный препарат Нексиум по мере необходимости («по требованию»). Максимальная доза в этом случае составляет: одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если у вас имеется тяжелое заболевание печени, лечащий врач может назначить вам более низкую дозу лекарственного препарата Нексиум.

Лечение язвы, вызванной *Helicobacter pylori*, и профилактика повторного возникновения язвы:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, два раза в сутки, в течение одной недели.
- Лечащий врач также может порекомендовать вам принимать антибиотики, например, амоксициллин и кларитромицин.

Лечение язвы желудка, вызванной приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП):

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки, в течение 4-8 недель.

Профилактика язвы желудка при приеме НПВП:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.

Избыточное количество кислоты в желудке, вызванное синдромом Золлингера-Эллисона:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет 40 мг два раза в сутки.
- Лечащий врач скорректирует дозу в зависимости от вашего состояния, а также определит продолжительность приема лекарственного препарата. Максимальная доза лекарственного препарата Нексиум составляет 80 мг два раза в сутки.

Длительное лечение после внутривенного введения лекарственного препарата Нексиум с целью профилактики повторного кровотечения из язвы:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет 40 мг один раз в сутки в течение 4 недель.

Применение лекарственного препарата Нексиум у подростков в возрасте от 12 лет и старше

Лечение изжоги, вызванной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ):

- Если лечащий врач обнаружит у вас незначительные повреждения пищевода, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составит 40 мг один раз в сутки в течение 4 недель. Лечащий врач может порекомендовать вам продолжить прием той же дозы лекарственного препарата в течение дополнительных 4 недель, если повреждения пищевода еще не зажили.
- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум после заживления пищевода составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если ваш пищевод не поврежден, рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, один раз в сутки.
- Если у вас имеется тяжелое заболевание печени, лечащий врач может назначить вам более низкую дозу лекарственного препарата Нексиум.

Лечение язвы, вызванной *Helicobacter pylori*, и профилактика повторного возникновения язвы:

- Рекомендуемая доза лекарственного препарата Нексиум составляет: одна таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, два раза в сутки, в течение одной недели.
- Лечащий врач также может порекомендовать вам принимать антибиотики, например, амоксициллин и кларитромицин.

Способ применения препарата Нексиум

- Вы можете принимать таблетки в любое время суток.
- Вы можете принимать таблетки во время приема пищи или натощак.
- Таблетки следует проглатывать целиком, запивая их водой. Не следует разжевывать или измельчать таблетки. Это связано с тем, что таблетки содержат покрытые оболочкой гранулы, которые предотвращают разрушение препарата в желудке под действием кислоты. Важно не повредить содержащиеся в таблетке гранулы при приеме.

Что делать, если у вас имеются затруднения с проглатыванием таблеток

- Если у вас имеются затруднения с проглатыванием таблеток:
 - Поместите таблетки в стакан с негазированной водой. Не используйте другие жидкости для растворения таблеток.
 - Перемешивайте жидкость до тех пор, пока таблетки не растворятся (смесь будет непрозрачной). Выпейте смесь непосредственно после приготовления или в течение 30 минут после приготовления. Всегда перемешивайте смесь перед тем, как ее выпить.
 - Следует убедиться, что вы выпили весь лекарственный препарат. Для этого тщательно прополосните стакан половиной стакана воды и выпейте ее. Твердые частицы содержат лекарственное средство – не разжевывайте и не измельчайте их.
 - Если вы вообще не можете глотать, таблетку можно смешать с небольшим количеством воды и поместить в шприц. Затем раствор может быть введен вам через трубку («желудочный зонд») непосредственно в желудок.

Применение лекарственного препарата Нексиум у детей в возрасте до 12 лет

Лекарственный препарат Нексиум в данной лекарственной форме (таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой) не рекомендован для применения у детей в возрасте младше 12 лет. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если вам потребуется дополнительная информация.

Применение лекарственного препарата Нексиум у пациентов пожилого возраста

Корректировка дозы лекарственного препарата Нексиум для пациентов пожилого возраста не требуется.

Если вы приняли препарата Нексиум больше, чем следовало

Если вы приняли больше таблеток лекарственного препарата Нексиум, чем вам назначено, незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если вы забыли принять препарат Нексиум

- Если вы забыли принять лекарственный препарат Нексиум, примите таблетку, как только вспомнили о пропущенной дозе. Однако, если приближается время приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу.
- Не принимайте двойную дозу лекарственного препарата Нексиум для восполнения пропущенной.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по применению лекарственного препарата Нексиум, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции.

Как и все лекарственные препараты, препарат Нексиум может вызывать нежелательные реакции, хотя они возникают не у всех.

Прекратите прием лекарственного препарата Нексиум и незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом, если у вас наблюдаются следующие серьезные нежелательные реакции:

- Пожелтение кожи, потемнение мочи и повышенная утомляемость. Данные симптомы могут свидетельствовать о заболеваниях печени. Данные нежелательные реакции являются редкими, частота возникновения составляет менее чем у 1 пациента из 1000 .
- Внезапное систящее дыхание, отек губ, языка и горла или тела, сыпь, обморок или затруднение при глотании (тяжелая аллергическая реакция). Данные нежелательные реакции являются редкими, частота возникновения составляет менее чем у 1 пациента из 1000 .
- Внезапное появление обширной сыпи или покраснения кожи с волдырями или шелушением, даже после нескольких недель лечения. Также может быть появление крупных волдырей и кровотечение в области губ, глаз, рта, носа и гениталий. Кожные высыпания могут перерасти в серьезные распространенные поражения кожи (шелушение эпидермиса и поверхности слизистой оболочки) с опасными для жизни последствиями. Это может быть «мультиформная эритема», «синдром Стивенса-Джонсона», «токсический эпидермальный некролиз» или «лекарственная реакция с

эозинофилией и системными симптомами». Данные нежелательные реакции являются очень редкими, частота возникновения составляет менее чем у 1 пациента из 10000.

Ниже перечислены иные нежелательные реакции, которые могут развиваться при применении лекарственного препарата Нексиум:

Частые нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 10):


- Головная боль.
- Нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, боль в животе, запор, вздутие живота (метеоризм).
- Чувство тошноты или рвота.
- Доброположительные полипы желудка.

Нечастые нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 100):

- Отек стоп и лодыжек.
- Нарушения сна (бессонница).
- Головокружение, ощущение покалывания, чувство сонливости.
- Вертиго (ощущение вращения окружающих предметов вокруг тела, или наоборот - тела вокруг окружающих предметов).
- Сухость во рту.
- Изменение лабораторных показателей, отражающих работу печени.
- Кожная сыпь, крапивница, зуд кожи.
- Перелом бедра, запястья или позвоночника (при применении лекарственного препарата Нексиум в высоких дозах в течение длительного времени).

Редкие нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 1000):

- Нарушения со стороны кровеносной системы, такие как снижение количества лейкоцитов или тромбоцитов. При этом может наблюдаться слабость, появление кровоподтеков, а также увеличивается риск развития инфекций.
- Снижение уровня натрия в крови, которое может сопровождаться слабостью, тошнотой (рвотой) и судорогами.
- Чувство возбуждения, спутанность сознания или депрессия.
- Вкусовые расстройства.
- Нарушения зрения, в частности затуманенное зрение (нечеткость зрения).
- Внезапное появление хрипов или одышки (бронхоспазм).
- Воспаление слизистой оболочки полости рта.
- Кандидоз кишечника (молочница) – инфекция, вызываемая патогенным грибком.
- Заболевания печени, включая желтуху, при которой могут наблюдаться пожелтение кожи, потемнение мочи и повышенная утомляемость.
- Выпадение волос (алопеция).
- Кожная сыпь, возникающая под действием солнечных лучей.
- Боль в суставах (артралгия) или боль в мышцах (миалгия).
- Общее недомогание и недостаток энергии (снижение работоспособности).
- Повышенное потоотделение.



Очень редкие нежелательные реакции (частота возникновения – менее чем у 1 пациента из 10000):

- Изменения в общем анализе крови, включая агранулоцитоз (снижение количества лейкоцитов).
- Агрессия.
- Состояние, при котором вы можете видеть, слышать или ощущать то, чего нет (галлюцинации).
- Тяжелые заболевания печени, приводящие к печеночной недостаточности и воспалению головного мозга.
- Внезапное появление сильной сыпи, волдырей или шелушения кожи. Данные симптомы могут сопровождаться повышением температуры и болями в суставах (мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами).
- Мышечная слабость.
- Тяжелые заболевания почек.
- Увеличение груди у мужчин.


Частота возникновения неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных):

- Если вы принимаете лекарственный препарат Нексиум более трех месяцев, уровень магния в крови может снижаться. Низкий уровень магния может являться причиной утомляемости, непроизвольных сокращений мышц, дезориентации, судорог, головокружения или учащенного сердцебиения. Если у вас появятся какие-либо из вышеупомянутых симптомов, немедленно сообщите об этом лечащему врачу. Низкий уровень магния также может привести к снижению уровня калия или кальция в крови. Лечащий врач может принять решение о выполнении регулярных анализов крови в целях контроля уровня магния.
- Воспаление кишечника (приводящее к диарее).
- Сыпь, возможно, сопровождающаяся болью в суставах.

Лекарственный препарат Нексиум в очень редких случаях может оказывать влияние на лейкоциты, приводя к развитию иммунодефицита. Если у вас инфекция, сопровождающаяся лихорадкой с резким ухудшением общего состояния, или лихорадка с симптомами местной инфекции, такими как, боль в области шеи, горла, полости рта, затрудненное мочеиспускание, вам следует незамедлительно проконсультироваться с лечащим врачом и выполнить анализ крови, чтобы исключить агранулоцитоз (снижение количества лейкоцитов). Проинформируйте лечащего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах.

Сообщение о нежелательных реакциях

В случае возникновения нежелательных реакций, включая не перечисленные в данном листке-вкладыше, сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата. Вы также можете напрямую отправлять сообщения о нежелательных реакциях.



Сообщения о нежелательных реакциях, выявленных на территории Республики Беларусь, направлять по адресу:

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Товарищеский пер., 2а, 220037, г. Минск, Республика Беларусь

Телефон: +375 17 2420029, факс: +375 17 2420029.

Сайт: <https://www.rceth.by/>.

Адрес эл. почты: rcpl@rceth.by

5. Хранение препарата Нексиум.

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности: 3 года.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Что содержит лекарственный препарат Нексиум

Действующее вещество: эзомепразол. Каждая таблетка кишечнорастворимая, покрытая пленочной оболочкой, содержит эзомепразола 20,0 мг, в виде эзомепразола магния тригидрата 22,3 мг.

Вспомогательные вещества: глицерол моностеарат 40-55, гидроксипропилцеллюоза, гипромеллоза, железа оксид красновато-коричневый CI 77491 (Е 172), железа оксид желтый CI 77492 (Е 172), магния стеарат, метакриловой и этакриловой кислот сополимер (1:1), целлюлоза микрокристаллическая, парафин синтетический, макрогол 6000, полисорбат 80, кросповидон, натрия стеарилфумарат, сахара сферические гранулы с диаметром 0.250 - 0.355 мм, содержащие: сахарозу, кукурузный крахмал (с добавками гидролизатов крахмала и пигментов), титана диоксид CI 77891 (Е 171), тальк, триэтилцитрат.

Внешний вид лекарственного препарата Нексиум и содержимое упаковки

Продолговатая, двояковыпуклая таблетка, покрытая пленочной оболочкой светло-розового цвета, с гравировкой «20 mG» на одной стороне и «^A ЕН» на другой стороне.

Упаковка: по 7 таблеток в блистере из алюминиевой фольги. 4 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку с защитной наклейкой с информацией переменного характера.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения: AstraZeneca UK Limited, Великобритания.

Нижеприведенная информация предназначена только для медицинских работников:

Введение лекарственного препарата Нексиум через желудочный зонд:

1. Поместите таблетку в шприц соответствующего объема и заполните шприц примерно 25 мл воды и 5 мл воздуха. Для некоторых желудочных зондов может потребоваться растворение таблеток в 50 мл воды, чтобы гранулы препарата не застревали в зонде.
2. Непосредственно после этого встрихивайте шприц в течение примерно 2 минут, чтобы таблетки растворились.
3. Держите шприц наконечником вверх и убедитесь, что наконечник не засорен.
4. Присоедините шприц к зонду, сохраняя указанное положение шприца.
5. Встрихните шприц и расположите его наконечником вниз. Немедленно введите 5-10 мл раствора в зонд. Переверните шприц после инъекции и встрихните (шприц следует держать наконечником вверх для предотвращения засорения наконечника).
6. Переверните шприц наконечником вниз и немедленно введите в зонд еще 5-10 мл раствора. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока весь раствор не будет введен.
7. Наполните шприц 25 мл воды и 5 мл воздуха и, при необходимости, повторите шаг 5, чтобы смыть оставшийся в шприце осадок. Для некоторых зондов может потребоваться 50 мл воды.