

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Стрептоцид

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Стрептоцид

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Сульфаниламид

**Лекарственная форма:** порошок для наружного применения

**Состав:** Сульфаниламид (стрептоцид) – 2,0 г или 5,0 г.

**Описание**

Белый или почти белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** антибиотики и противомикробные средства; применяемые в дерматологии; противомикробные средства для наружного применения; сульфаниламиды.

**Код АТХ:** D06BA05

**Фармакологические свойства**

Стрептоцид - противомикробное бактериостатическое средство. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК) и угнетением фермента дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в результате - к нарушению синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Активность проявляется в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I – II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему веществу или к группе сульфаниламидов, заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, почечная, печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (для данной формы выпуска).

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, наносят непосредственно на пораженную поверхность; перевязки проводят через 1-2 дня. Максимальная разовая доза для взрослых – 5 г, максимальная суточная доза – 15 г.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Если после лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

### **Побочное действие**

При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны аллергические реакции, развитие которых требует немедленной отмены препарата.

Кроме того, возможны: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или были замечены любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

*Симптомы:* тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия; при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха.

*Лечение:* обильное питье; при случайном приеме внутрь - промывание желудка.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Стрептоцид проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости назначают противомикробные препараты внутрь. При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции печени и почек.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводилось.

Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

### **Форма выпуска**

Порошок для наружного применения. По 2 г или 5 г в термосвариваемые пакеты из материала комбинированного на основе бумаги или по 5 г в банку полимерную с крышкой.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пакет из пленки полиэтиленовой.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пакеты из бумаги оберточной.

По 1 банке вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

*Для стационаров.*

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 600, 1000 пакетов вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в пакет из пленки полиэтиленовой.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/организация, принимающая претензии:**

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия

Юридический адрес: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а

Адрес производства: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. б/н

Адрес для направления претензий потребителей:

188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а

Тел/факс: +7 (812) 336-16-82