МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Стрептоцид

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- *Сохраняйте инструкцию по применению, она может понадобиться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

Регистрационный номер: ЛП-005046
Торговое наименование: Стрептоцид
Международное непатентованное наименование: Сульфаниламид
Лекарственная форма: порошок для наружного применения
Состав: Сульфаниламид (стрептоцид) – 2,0 г или 5,0 г.

Описание
Белый или почти белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство - сульфаниламид.
Код АТХ: D06BA05

Фармакологические свойства
Стрептоцид - противомикробное бактериостатическое средство. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК) и угнетением фермента дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в результате - к нарушению синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Активность проявляется в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Показания к применению
В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I – II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к сульфаниламидам. Беременность, период грудного вскармливания. Заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, тиреотоксикоз, хроническая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, азотемия, порфирия, печеночная недостаточность, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

С осторожностью
Детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Наружно, наносят непосредственно на пораженную поверхность; перевязки проводят через 1-2 дня. Максимальная разовая доза для взрослых – 5 г, максимальная суточная доза – 15 г. Для детей старше 3 лет: разовая доза – 300 мг, суточная доза – 300 мг.
Если после лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие
При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны аллер-

гические реакции, развитие которых требует немедленной отмены препарата. Кроме того, возможны: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или были замечены любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия; при продолжительной передозировке - тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха.

Лечение: обильное питьё; при случайном приеме внутрь - промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Стрептоцид проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости назначают противомикробные препараты внутрь. При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции печени и почек.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводилось.

Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Порошок для наружного применения. По 2 г или 5 г в термосвариваемые пакеты из материала комбинированного на основе бумаги или по 5 г в банку полимерную с крышкой.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пакет из пленки полиэтиленовой.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пакеты из бумаги оберточной.

По 1 банке вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Для стационаров.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 600, 1000 пакетов вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в пакет из пленки полиэтиленовой.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия

Юридический адрес: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а

Адрес производства: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. б/н

Адрес для направления претензий потребителей:

188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а

Тел/факс: (812) 336-16-82