

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
МЕНОВАЗИН

Номер регистрационного удостоверения ЛСР-005779/10

Торговое наименование: Меновазин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Бензокаиn + Прокaин + Лeвоментол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 мл:

Действующие вещества:

Левоментол - 2,5 г

Прокaинa гидрохлорид (новокаиnа гидрохлорид) - 1,0 г

Бензокаиn (анестезин) - 1,0 г

Вспомогательные вещества:

Этанол (спирт этиловый) 70 % - до 100 мл.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа: местноанестезирующее средство.

Код АТХ: [D04AB]

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местноанестезирующее действие.

Левоментол при нанесении на кожу вызывает раздражение мерных окончаний, расширяет поверхностные сосуды кожи, вызывая ощущение прохлады, сопровождающееся анальгезирующим эффектом и облегчением зуда. Усиливает анестезирующее действие прокаиnа и бензокаиnа.

Прокaин - местноанестезирующее средство с умеренной анестезирующей активностью. Блокирует натриевые каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по мерным волокнам.

Бензокаиn - местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по мерным волокнам.

Показания к применению

В качестве местноанестезирующего средства при невралгиях, миалгиях, артралгиях и зудящих дерматозах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожного покрова или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема). Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Способ применения и дозы

Наружно, наносят на кожу над пораженной областью и растирают или наносят на пораженные участки кожи (зудящие дерматозы) 2-3 раза в сутки. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочные действия

Аллергические реакции, контактный дерматит. При продолжительном применении возможна головкружение, общая слабость, снижение артериального давления. В этих случаях прекращают применение препарата.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками из полиэтилена высокого давления или полиэтилена высокого давления и навинчиваемыми крышками пластмассовыми из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропиленa или пробками или пробками полимерными из полиэтилена высокого давления или из полипропиленa или пробками с уплотнительными элементами полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропиленa или пробками полиэтиленовыми из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или пробками «Топаз» с крышками навинчиваемыми; или крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропиленa, или «Топаз», или укупоренные крышками навинчиваемыми с уплотнительными элементами или

укороченными крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена (с уплотняющим элементом и палочкой кисти), допускается комплектация насадкой распылительной с колпачком или без колпачка, дополнительно помещаемой в пачку; или укороченные насадкой распылительной с колпачком или без колпачка, или по 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или полиэтилентерефталата, укороченные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или укороченные пробками полимерными и крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или укороченные крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, или крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена (с уплотняющим элементом и палочкой кисти), допускается комплектация насадкой распылительной с колпачком или без колпачка, дополнительно помещаемой в пачку; или укороченные насадкой распылительной с колпачком или без колпачка.

По 50, 100 мл препарата в банки или флаконы из оранжевого стекла, укороченные пробками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена или пробками полиэфирными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления и крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена или «Топаз», укороченные пробками с уплотнительным элементом полимерными из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена, и навинчиваемыми крышками или крышками полимерными из полиэтилена низкого давления или из полипропилена, и навинчиваемыми крышками или крышками навинчиваемыми или крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или из полипропилена; или во флаконы из оранжевого стекла, или в бутылки из оранжевого стекла, укороченные пробками капроновыми и крышками навинчиваемыми или крышками навинчиваемыми с пробкой пластмассовой и крышками навинчиваемыми с «прокладкой» пластмассовой из полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления или из полипропилена или крышками «Топаз» или колпачками алюминиевыми с прокладками, допускается комплектация насадкой распылительной с колпачком или без колпачка, дополнительно помещаемой в пачку; или укороченные насадкой распылительной с колпачком или без колпачка.

На каждый флакон, банку, бутылку, коробку наклеивают этикетку из бумаги лисей или этикеточной или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон, банку, бутылку с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д.70.

Организация, принимающая претензии

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86

Тел./факс: (846) 373-81-07 (846) 373-81-08

Адрес места производства

Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дуброва, на территории завода «Коммунар», здание №2.

Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д.70

или

Организация, принимающая претензии

ООО «Технопарк-Центра», Россия, 123557, г. Москва, ул. Клишикина, д. 22, стр. 1.

Тел./факс: (495) 994-94-79.

Адрес места производства

Московская обл., Талдомский район, пос. Вербица, ул. Лернитова.