


9920 - 2024

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**Карсил® Макс 110 мг капсулы**

Силимарин (Silymarin)



Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Карсил® Макс, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Карсил® Макс.
3. Прием препарата Карсил® Макс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Карсил® Макс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КАРСИЛ® МАКС, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Карсил® Макс – лекарственный препарат, который содержит активное вещество силимарин, выделенное из плодов растения расторопши пятнистой. Силимарин активирует синтез белков и фосфолипидов в поврежденных клетках печени, стабилизирует их клеточные мембраны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие), тем самым защищая клетки печени от вредных воздействий и способствуя их восстановлению.


Используется в качестве симптоматического средства в комплексной терапии токсических поражений печени, стеатоза печени (неалкогольного и алкогольного); для поддерживающего лечения хронических воспалительных заболеваний печени, в комплексной терапии цирроза печени, для профилактики поражения печени при длительном употреблении лекарственных препаратов, алкоголя или при хронической интоксикации (в том числе профессиональной).

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА КАРСИЛ® МАКС

Не принимайте препарат Карсил® Макс:

- если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).
- детский возраст до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности



Перед применением препарата Карсил® Макс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обратитесь к лечащему врачу, если у вас есть заболевания, сопровождающиеся гормональными нарушениями (например, опухоли матки, яичников или молочной железы, опухоль предстательной железы), из-за возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина; если препарат необходимо применять детям старше 12 лет.

Лечение препаратом Карсил® Макс не может заменить диету или воздержание от употребления алкоголя при поражениях печени.

Дети

Капсулы Карсил® Макс не следует применять детям младше 12 лет из-за отсутствия достаточных клинических данных по их применению.

Другие препараты и препарат Карсил® Макс

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Карсил® Макс может уменьшить эффективность пероральных противозачаточных средств и тамоксифена (препарата для лечения опухолей).

Препарат Карсил® Макс может усилить действие таких лекарственных препаратов, как диазепам и алпразолам (противосудорожные средства), кетоконазол (противогрибковое средство), аторвастатин и ловастатин (препараты, снижающие уровень холестерина), винбластин (препарат для лечения опухолей).

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение капсул Карсил® Макс при беременности и в период кормления грудью возможно только по медицинским показаниям и только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Карсил® Макс не оказывает неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА КАРСИЛ® МАКС

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Взрослые и дети старше 12 лет

Рекомендуемая доза:

- при легких случаях и среднетяжелых случаях по 1 капсуле 1-2 раза в день;
- лечение тяжелых поражений печени начинается с дозы 1 капсула 3 раза в день.
- для профилактики химической интоксикации- 1-2 капсулы в день.

Курс лечения продолжается не менее 3 месяцев.

Капсулы принимают внутрь, запивая достаточным количеством жидкости.

Если вы приняли препарата Карсил® Макс больше, чем следовало



Если вы приняли дозу, превышающую назначенную, обратитесь за советом к своему лечащему врачу.

Случаев передозировки препарата не зарегистрировано.

Если вы забыли принять препарат Карсил® Макс

Если Вы пропустили одну дозу, примите ее как можно скорее. Если наступило время для приема следующей дозы, примите ее как обычно. Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной. Продолжайте принимать лекарственный препарат по назначению.

Если у вас есть любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарственного препарата, обратитесь к вашему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Капсулы Карсил® Макс хорошо переносятся. Нежелательные реакции возникают очень редко и обычно слабо выражены и преходящи.

В единичных случаях может возникнуть аллергическая реакция на лекарственный препарат.

- Прекратите прием капсул Карсил® Макс и немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнет тяжелая аллергическая реакция с затрудненным дыханием и головокружением (анафилактический шок).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000) возможны кожные аллергические реакции, такие как зуд и сыпь.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000) можно наблюдать усиление существующих вестибулярных нарушений; диарея в результате усиления функции печени и желчи;

Неизвестно (на основании имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): тошнота, рвота, диспепсия, избыточное скопление газов в кишечнике.

Сообщение о нежелательных реакциях.

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а, тел./факс: +375 17 242 00 29, адрес электронной почты: rcpl@rceth.by, www.rceth.by.


Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАРСИЛ® МАКС

Хранить при температуре не выше 25 °С.

9920 - 2024

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.



Срок годности: 5 (пять) лет.

Не принимайте Карсил после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Карсил® Макс содержит

Действующее вещество:

Расторопши пятнистой плодов экстракт сухой, очищенный и стандартизированный (35-50:1, экстрагент - метанол) или (20-70:1, экстрагент - ацетон) — 200,0-244,4 мг (эквивалентно 110,0 мг силимарина).

Вспомогательные вещества:

Содержимое капсулы: маннитол (Е 421), повидон, полисорбат, натрия лаурилсульфат, карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат.

Состав желатиновой капсулы:

Корпус: краситель железа оксид красный (Е 172), краситель железа оксид желтый (Е 172), титана диоксид (Е 171), желатин.

Крышечка: краситель железа оксид черный (Е 172), краситель железа оксид красный (Е 172), титана диоксид (Е 171), желатин.

Внешний вид Карсил® Макс и содержимое его упаковки

Твердые цилиндрические желатиновые капсулы.

Корпус розово-коричневого цвета, непрозрачный, крышечка коричневого цвета, непрозрачная.

Содержимое капсулы: порошкообразная масса от светло-желтого до желто-коричневого цвета с агломератами, со слабым характерным запахом.

По 6 (шесть) капсул в блистере из ПВХ пленки/алюминиевой фольги;

5 (пять) блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

тел.: (+3592) 813 42 00, факс: (+3592) 936 02 86

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Представительство АО Софарма (Республика Болгария) в Республике Беларусь,

г. Минск, пер. 1 Загородный, 20-24, каб. 8, 15 этаж, 220073, тел./факс: +375 17 242-82-92.

Адрес электронной почты: info@sopharma.by.