

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА: ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ (ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)**

НД РБ

ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД, таблетки подъязычные 100 мг


3020Б-2022

**ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ,
ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ**

- Перед приемом препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.
- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или> работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД.
3. Применение ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

1 таблетка препарата ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД содержит действующее вещество: 100 мг глицина. Фармакотерапевтическая группа: прочие средства, применяемые для лечения заболеваний нервной системы.

Лекарственный препарат ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД содержит заменимую аминокислоту (естественный метаболит) – глицин, который является нейромедиатором тормозного типа действия и участвует в регуляции метаболических процессов в центральной нервной системе.

ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД применяется у взрослых и детей старше 3 лет в составе комплексной терапии:

- функциональных и органических заболеваний нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (невротические расстройства, соматоформная вегетативная дисфункция, последствия перенесенной нейроинфекции, черепно-мозговой травмы, инсульта)
- ишемического инсульта.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД

Не применяйте ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД при повышенной чувствительности к действующим веществам или к вспомогательным веществам, указанным в разделе 6.

Особые указания и меры предосторожности

Если Вы склонны к артериальной гипотензии (снижению артериального давления), необходимо контролировать уровень артериального давления и, при необходимости, проводить коррекцию дозы препарата (принимать препарат в меньших дозах и при условии регулярного контроля артериального давления). При снижении артериального давления ниже привычного, вам

необходимо прекратить прием препарата.

Дети

Не давайте препарат ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД детям в возрасте до 3 лет.

Другие препараты и ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты

После консультации с врачом возможно применение ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД в составе комплексной терапии совместно с препаратами, подавляющими психическую (высшую) нервную деятельность (нейролептики); препаратами, снимающими тревогу и страх (анксиолитики); антidepressантов; снотворных и противосудорожных препаратов.

Беременность и грудное вскармливание

Данные о применении глицина у беременных женщин отсутствуют или ограничены.

Применение ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД во время беременности и в период грудного вскармливания, не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Во время приема ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД воздержитесь от управления автотранспортом или работы с механизмами, а также от занятий потенциально опасными видами деятельности.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД

Как принимать ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД

ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД необходимо применять по 100 мг (по 1 таблетке или в виде порошка после измельчения таблетки) следующим образом:

- сублингвально (помещение препарата под язык);
- трансбукально (помещение препарата между верхней губой и десной или в полости рта).

ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 14-30 дней.

Применение ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД у детей

Не применять у детей до 3 лет. ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД не рекомендуется для подъязычного (сублингвального) или трансбукального приема детям до 6 лет. Детям от 3 до 6 лет таблетку перед приемом необходимо растереть и растворить в чайной ложке холодной кипяченой воды.

Продолжительность применения ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД

При функциональных и органических поражениях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной лабильностью и нарушением сна, детям старше 3 лет и взрослым назначают по 1 таблетке 2-3 раза в день, курс лечения 7-14 дней. Курс лечения можно увеличить до 30 дней, при необходимости курс повторяют через 30 дней.

При нарушениях сна ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД назначают за 20 минут до сна или непосредственно перед сном по 1 таблетке.

При ишемическом мозговом инсульте: в течение первых 3-6 часов от развития инсульта назначают 1000 мг трансбукально или подъязычно с одной чайной ложкой воды, далее в течение 1-5 суток по 1000 мг в сутки, затем в течение последующих 30 суток 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

Длительность применения определяется особенностями заболевания, достигнутым эффектом и переносимостью лекарственного препарата.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

3020Б-2021



4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- ухудшение концентрации внимания;
- головная боль;
- напряжение;
- раздражительность.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- реакции гиперчувствительности (сыпь, зуд, крапивница);
- тошнота.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов:

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: с использованием формы извещения о нежелательной реакции на сайте www.rceth.by, по электронной почте gcp1@rceth.by или по адресу: Товарищеский пер. 2а, г. Минск, 220037, Республика Беларусь, тел/факс 242-00-29.

5. ХРАНЕНИЕ ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД

Храните препарат в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД содержит.

Каждая таблетка ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД содержит действующее вещество: 100 мг глицина.

Вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, повидон К-30, магния стеарат.

Внешний вид ГЛИЦИН ФАРМЛЭНД и содержимое упаковки.

Форма выпуска и описание. Таблетки белого цвета с элементами мраморности, плоскоцилиндрической формы с фаской.

Упаковка. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. По 50 таблеток в банке полимерной с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия. Одну банку или 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем во вторичной упаковке из картона коробочного.

Порядок отпуска из аптек: Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

СОГЛАСОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения

3020Б-2022



Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 124,
ком. 3.

Адрес электронной почты: mail@pharmland.by

3020Б-2022

Производитель

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью
«ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124,
124/1.

Адрес электронной почты: mail@pharmland.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к
должителю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации:

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертизы и
испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.