



Листок-вкладыш – информация для потребителя
АЛЛОХОЛ, таблетки, покрытые оболочкой
Действующие вещества: желчь сухая, чеснока порошок,
крапивы листья, уголь активированный

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат АЛЛОХОЛ и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата АЛЛОХОЛ
3. Применение препарата АЛЛОХОЛ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата АЛЛОХОЛ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат АЛЛОХОЛ,
и для чего его применяют**

АЛЛОХОЛ является лекарственным препаратом, который применяют в составе комплексной терапии:

- при хроническом воспалении желчных протоков (холангит);
- при хроническом воспалении желчного пузыря (холецистит);
- при нарушении сокращений желчевыводящих протоков (дискинезия желчевыводящих путей);
- хронических запоров;
- после удаления желчного пузыря.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата АЛЛОХОЛ

Не принимайте препарат АЛЛОХОЛ при:

- повышенной чувствительности к одному из действующих веществ или любому из вспомогательных компонентов препарата (см. раздел б);
- гепатите, дистрофии печени, панкреатите, желтухе, желчнокаменной болезни или нарушении оттока желчи;
- язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- спазме сфинктера Одди (может проявляться приступами сильных или умеренных повторяющихся болей в брюшной полости, диспепсией, тошнотой, режой рвотой, ощущением тяжести);

- заболеваниях пищеварительного тракта, характеризующихся воспалением слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника;
- детском возрасте до 18 лет.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из выше перечисленного, сообщите лечащему врачу перед приемом препарата АЛЛОХОЛ.

Особые указания и меры предосторожности

Следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать препарат АЛЛОХОЛ.

Препарат АЛЛОХОЛ содержит сахарозу (сахар белый). Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Препарат АЛЛОХОЛ содержит краситель апельсиновый желтый Е 110, который может вызывать аллергические реакции.

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что в состав препарата входит сахароза. В одной таблетке содержится около 0,13 г сахарозы (сахара белого), что соответствует 0,013 ХЕ; в максимальной суточной дозе препарата содержится около 1,03 г сахарозы (сахара белого), что соответствует 0,1 ХЕ.

Дети и подростки

Препарат АЛЛОХОЛ не следует давать детям или подросткам до 18 лет, так как он содержит в составе краситель апельсиновый желтый Е 110, который может вызывать аллергические реакции.

Другие препараты и АЛЛОХОЛ

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол – снижают всасывание (и уменьшают эффект) препарата; одновременный прием нецелесообразен.

Одновременное применение препарата АЛЛОХОЛ с холеретиками синтетического или растительного происхождения (желчегонные препараты) усиливает желчегонный эффект.

АЛЛОХОЛ может усиливать действие слабительных препаратов.

АЛЛОХОЛ способствует лучшему всасыванию жирорастворимых витаминов.

Если Вы принимаете варфарин, потребление чеснока, входящего в состав препарата, может увеличивать продолжительность кровотечения.

АЛЛОХОЛ с пищей, напитками и алкоголем

АЛЛОХОЛ необходимо принимать после еды.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Крапивы листья, входящие в состав препарата АЛЛОХОЛ, могут усиливать тонус мышц матки.

Применять препарат во время беременности и в период лактации допускается только после оценки соотношения польза/риск под наблюдением врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

АЛЛОХОЛ не влияет на способность к управлению транспортным средством и работе с механизмами.

3. Применение препарата АЛЛОХОЛ

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений либо вопросов, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Лекарственный препарат следует принимать внутрь, после еды, запивая водой.

По 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Продолжительность лечения 3-4 недели.

При обострении хронических заболеваний желчевыводящих путей – по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 1-2 месяцев.

При необходимости по назначению врача курс лечения повторяют с перерывом в 3 месяца.

Применение у детей и подростков

АЛЛОХОЛ не следует применять для лечения детей и подростков младше 18 лет.

Если Вы пропустили прием препарата АЛЛОХОЛ

Если Вы забыли принять АЛЛОХОЛ, не принимайте двойную дозу препарата. Примите следующую дозу в обычное время.

Если Вы приняли больше препарата, чем назначено

В случае приема большей, чем рекомендуемая, дозы лекарственного препарата, возможно появление следующих симптомов: диарея, тошнота, изжога, зуд кожи, повышение уровня трансаминаз в крови.

Если Вы досрочно прекращаете прием препарата АЛЛОХОЛ

Ваш лечащий врач определит, когда Вам следует прекратить лечение. Если Вы желаете закончить его раньше, обратитесь к Вашему врачу, чтобы обсудить с ним другие варианты лечения.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, АЛЛОХОЛ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата возможны аллергические реакции, диарея. При их появлении необходимо прекратить прием препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.gceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата АЛЛОХОЛ

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 4 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Не применять препарат, если Вы заметили, что контурная ячейковая упаковка, в которой находятся таблетки, повреждена.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Одна таблетка содержит *действующие вещества*: желчь сухая – 80 мг, чеснока порошок – 40 мг, крапивы листья – 5 мг, уголь активированный – 25 мг.

Вспомогательные вещества: магния оксид тяжелый, картофельный крахмал, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат.

Оболочка: сахар белый, магния карбонат основной легкий, кремния диоксид коллоидный безводный, титана диоксид, коповидон К-28, краситель хинолиновый желтый Е 104, краситель апельсиновый желтый Е 110, воск пчелиный желтый.

Внешний вид препарата АЛЛОХОЛ и содержимое упаковки

АЛЛОХОЛ, таблетки, покрытые оболочкой, светло-желтого цвета, со специфическим запахом, с двояковыпуклой поверхностью.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги ГУ ФТЛ. Одна или пять контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: