


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
по применению лекарственного средства
ДИЛТИАЗЕМ ФАРМЛЭНД таблетки 60 мг
(информация для пациентов)

Регистрационное удостоверение РБ

Торговое название: Дилтиазем Фармлэнд

Международное непатентованное название: Дилтиазем (Diltiazem)

Форма выпуска: таблетки



Прежде, чем Вы начнете принимать это лекарство, прочитайте тщательно весь листок - вкладыш:

- Не выбрасывайте этот листок. Возможно, вам придется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
- Это лекарство должно быть выписано вам врачом. Не передавайте его другим. Это может нанести им вред, даже если их симптомы такие же, как ваши.
- Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Что такое Дилтиазем Фармлэнд и для чего он используется:

Таблетки Дилтиазема Фармлэнд белого цвета, круглые, с двояковыпуклой поверхностью, с риской на одной стороне.

Риска на таблетке предназначена для деления таблетки с целью более удобного приема, но не для ее разделения на равные дозы.

Каждая таблетка Дилтиазем Фармлэнд содержит действующего вещества: дилтиазема гидрохлорида 60 мг, и вспомогательные вещества: лактоза моногидрат 36,94 мг, крахмал кукурузный, микрокристаллическая целлюлоза, кальция фосфат двухосновный, магния стеарат, повидон К-30, желатин, гидроксипропилметилцеллюлоза, тальк очищенный, кремния диоксид коллоидный безводный. **Дилтиазем Фармлэнд применяется в следующих случаях:**

Таблетки Дилтиазема Фармлэнд относятся к группе лекарственных средств, называемых селективными блокаторами кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце.

Таблетки Дилтиазема Фармлэнд используются для:

- предотвращения и лечения (длительной) стенокардии; не предназначены для купирования острых приступов стенокардии
- лечения артериальной гипертензии

Не принимайте Дилтиазем Фармлэнд в следующих случаях:

- у вас есть аллергия на дилтиазем гидрохлорид или любой другой компонент лекарственного средства;
- если вы беременны или кормите грудью;
- вы принимаете лекарство под названием дантролен, используемое при сильном мышечном спазме или сильной лихорадке;
- у вас очень медленное сердцебиение - менее 50 ударов в минуту;
- у вас сердечная недостаточность и проблемы с кровообращением в легких. При наличии этих заболеваний вас может беспокоить одышка и отеки голеней;
- вы уже принимаете лекарство, содержащее ивабрадин, для лечения заболевания сердца;

- у вас есть другие серьезные проблемы с сердцем, которые могут включать в себя нарушения ритма, сердцебиение (если у вас нет кардиостимулятора).

Не принимайте данное лекарственное средство, если к вам относится что-либо из перечисленного. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать Дилтиазем Фармлэнд.

В обязательном порядке проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- если у вас есть другие проблемы с сердцем;
- если вам собираются делать операцию;
- если у вас наблюдаются резкие изменения настроения;
- если у вас есть проблемы с кишечником;

Ваш доктор проверит вас более внимательно перед началом приема препарата.

- если Вам больше 65 лет;
- если у вас проблемы с печенью или почками;
- если у вас диабет;
- если у вас есть или была астма;
- если вы принимаете любые бета-блокаторы.

Если вы не уверены в чем-то, поговорите с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Дилтиазем Фармлэнд.

Обязательно сообщите врачу, если вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарственные средства, в том числе безрецептурные лекарственные средства и травы, особенно следующие:

В частности, не принимайте это лекарство и сообщите своему врачу, если вы принимаете:

- Дантролен (раствор), используемый при сильном мышечном спазме или сильной лихорадке (так называемая «злокачественная гипертермия»);
- Лекарственные препараты, содержащие ивабрадин, используемые для лечения некоторых заболеваний сердца.

Дилтиазем Фармлэнд может усиливать действие следующих лекарств:

- для лечения высокого кровяного давления, такие как доксазозин, тамсулозин, атенолол, пропранолол или ацебутолол;
- применяемые для нормализации сердечного ритма, такие как амиодарон и дигоксин;
- для лечения стенокардии, такие как глицерина тринитрат или изосорбида тринитрат;
- для лечения высоких уровней холестерина, такие как симвастатин, флувастатин и аторвастатин;
- циклоспорин (для подавления иммунной системы, например, после трансплантации органов);
- фенитоин (при эпилепсии);
- антиагрегантные лекарства, используемые для снижения свертывания крови, такие как аспирин или клопидогрел;
- йод-содержащие контрастные препараты (используемые для диагностики с использованием рентгеновских лучей);
- карбамазепин (при эпилепсии);
- теofilлин (при проблемах с дыханием);
- препараты лития (при лечении психических заболеваний);
- для лечения бессонницы или беспокойства, такие как триазолам или мидазолам;
- метилпреднизолон (при воспалении);
- цилостазол, используется для лечение судорожных болей в ногах, возникающих при недостаточном кровоснабжении.


Дилтиазем Фармлэнд может уменьшить эффект:

- рифампицина, применяемого при лечении туберкулеза.

Следующие лекарства могут усиливать действие Дилтиазема Фармлэнд:

- лекарства, используемые при язве желудка, такие как циметидин и ранитидин.

Применение Дилтиазема Фармлэнд с едой и питьем:




Рекомендуется ограничить количество грейпфрутового сока при приеме препарата. Так как это может повысить уровень активного вещества дилтиазема в крови и увеличить вероятность развития побочных эффектов. Если вы обеспокоены, вам следует прекратить пить грейпфрутовый сок и проконсультироваться с врачом.

Беременность и кормление грудью:

Не принимайте Дилтиазем Фармлэнд, если вы беременны (подозреваете, что беременны), планируете забеременеть или если вы кормите ребенка грудью. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Дилтиазем Фармлэнд может вызвать головокружение и слабость. В этом случае не садитесь за руль и не управляйте какими-либо механизмами.



Непереносимость сахара.

Если врач сообщил, что у вас непереносимость некоторых сахаров, прежде чем принимать это лекарство, свяжитесь с врачом, так как оно содержит лактозу.

Как принимать Дилтиазем Фармлэнд:

Всегда принимайте Дилтиазем Фармлэнд точно по назначению врача. Если вы в чем-то не уверены, спросите доктора еще раз. Таблетка принимается внутрь.

Взрослые

Поддерживающая доза составляет одну таблетку (60 мг) три раза в день. При необходимости ваш врач может увеличить дозу до двух таблеток три раза в день или четыре раза в день.

Пожилые пациенты и пациенты с нарушенной функцией почек

Первично по одной таблетке (60 мг) дважды в день. Ваш доктор должен откорректировать дозу в соответствии с реакцией вашего организма.

Дети

Применение не рекомендуется.

Если вы приняли дозу Дилтиазема Фармлэнд большую, чем рекомендовал врач:

Не принимайте большее количество таблеток, чем вам прописал врач. Если вы приняли большее количество таблеток, сразу же вызовите скорую помощь или сообщите своему врачу. Передозировка Дилтиазема Фармлэнд может вызвать головокружение или слабость, помутнение зрения, боль в груди, одышку, обморок, необычно быстрое или медленное сердцебиение, невнятную речь, спутанность сознания, кому, внезапную смерть и снижение функции почек.

Если вы забыли вовремя принять очередную дозу Дилтиазема Фармлэнд:

Примите таблетку, как только вспомнили об этом. Затем продолжайте прием как обычно. Не принимайте две дозы в одно и то же время, чтобы компенсировать забытую дозу.

Если вы перестанете принимать Дилтиазем Фармлэнд:

Продолжайте принимать Дилтиазем Фармлэнд, пока ваш доктор не отменит препарат. Не прекращайте принимать их только потому, что вы чувствуете себя лучше. Если вы самостоятельно отмените препарат, ваше состояние может ухудшиться.

Исследования и анализы:

Ваш доктор может назначать регулярные анализы в течение периода лечения Дилтиаземом Фармлэнд. Они могут включать проверку вашего сердца и анализы крови для проверки состояния ваших печени и почек.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы по использованию препарата, обратитесь к своему врачу или фармацевту


Возможные побочные эффекты:

Как и все лекарственные средства, таблетки Дилтиазема Фармлэнд могут вызвать побочные эффекты, хотя они проявляются не у каждого пациента.

Немедленно прекратите прием препарата и обратитесь к врачу или отправляйтесь в больницу, если:

Частота неизвестна (не может быть оценена из доступных данных):

- У вас аллергическая реакция. Ее признаки могут включать в себя: сыпь, затруднение глотания или проблемы с дыханием, отек губ, лица, горла или языка.
- У вас красная или бугорковая кожная сыпь, опухшие веки, лицо, губы, горло или язык, затрудненное глотание.
- Ваша астма ухудшается.
- У вас проблемы с дыханием, появились хрипы, чувство стеснения в груди (так называемый «бронхоспазм»).
- У вас появились волдыри или шелушение кожи вокруг губ, глаз, рта, носа и половых органов, симптомы гриппа и лихорадка. Это может быть болезнь под названием «синдром Стивенса-Джонсона».
- У вас появилась выраженная сыпь, переходящая в волдыри, возможно с отслоением кожи на больших участках кожи. Состояние будет сопровождаться общим недомоганием, лихорадкой, ознобом и болью в мышцах. Это может быть болезнь под названием «токсический эпидермальный некролиз».
- У вас появилась кожная сыпь или кожные образования с розовым / красным кольцом и бледным центром, возможно зудящие, чешуйчатые или наполненные жидкостью. Особенно сыпь может появляться на ладонях или подошвах ваших ног. Это может быть признаком серьезной аллергии на лекарство под названием «мультиформная эритема».



Обязательно проконсультируйтесь с врачом при появлении любых из следующих симптомов, возможно, вам потребуется серьезная медицинская помощь:

Частые (менее 1 случая на 10 пациентов):

- замедленное или неравномерное сердцебиение;
- учащенная, неравномерная или выраженная частота сокращений сердца (сердцебиение).

Частота неизвестна (не может быть оценена из доступных данных):

- кожная сыпь, вызванная сужением или закупоркой кровеносных сосудов (так называемый «вакулит»);
- одышка, чувство усталости совместно с отеками лодыжек и голеней. Это возможный признак сердечной недостаточности;
- необычные движения языка, мышечные спазмы лица, закатывание глаз и дрожь;
- повышение температуры, чувство усталости, потеря аппетита, боль в животе, тошнота. Это может быть признаком воспаления печени (так называемый «гепатит»);
- увеличение количества мочи, повышенная жажда, сухость во рту или кожи. Это могут быть признаки высокого уровня сахара в крови (гипергликемия);
- повышается риск получить солнечный ожог, и он может быть более выраженным, чем у тех, кто не принимает Дилтиазем Фармлэнд. Вам следует использовать защиту от солнца во время терапии этого препарата;
- увеличение груди у мужчин.

Расскажите своему врачу как можно скорее, если у вас возникли какие-либо из следующих побочных эффектов:

Очень частые (более 1 случая на 10 пациентов): отеки голеней.

Частые (менее 1 случая на 10 пациентов): диспепсия, боли в животе, запоры и диарея.

Нечастые (менее 1 случая на 100 пациентов): головокружение, чувство пустоты в голове или потеря сознания, когда вы быстро встаете или садитесь (низкое артериальное давление).

Редкие (менее 1 случая на 1000 пациентов): сухость во рту; зудящая, бугорковая сыпь (так называемая крапивница).

Частота неизвестна (не может быть оценена из доступных данных): отек десен.

Расскажите своему врачу или фармацевту, если любой из следующих побочных эффектов становится серьезным или длится дольше, чем несколько дней:

Частые (менее 1 случая на 10 пациентов): головная боль, приливы (ощущение тепла), чувство тошноты или рвота, общее недомогание, слабость или усталость, чувство головокружения, покраснение кожи.

Нечастые (менее 1 случая на 100 пациентов): бессонница.


Частота неизвестна (не может быть оценена из доступных данных): изменения настроения, включая депрессию; кровотечение или кровоподтеки под кожей.

Анализ крови

Дилтиазем Фармлэнд может изменять уровень показателей ферментов печени в крови. Это может означать, что ваша печень не работает должным образом.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по применению препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <https://www.gsej.by/>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.



Как хранить Дилтиазем Фармлэнд:

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка:

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. По 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем во вторичной упаковке (пачке).

Срок годности Дилтиазема Фармлэнд:

2 года

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту врача.

Произведено:

«Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд» (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124-3, тел/факс 293-31-90