


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по медицинскому применению лекарственного средства **КАМФОРНЫЙ СПИРТ**

Перед применением данного лекарственного средства полностью прочтайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре.

Это лекарственное средство назначено именно Вам. Не передавайте его другим. Оно может навредить этим людям, даже, если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе «Побочное действие» листка-вкладыша.

Торговое название: Камфорный спирт.

Форма выпуска: раствор спиртовой для наружного применения 100 мг/мл.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом камфоры.

Состав: один флакон содержит: действующее вещество: камфоры рацемической – 4 г; вспомогательное вещество: спирт этиловый 70 %.

Лекарственное средство содержит не менее 60 % (об/об) этанола.

Фармакотерапевтическая группа: прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах.

Код АТХ: М02АХ10.

Фармакологические свойства

Оказывает местнораздражающее, противовоспалительное и местное анальгетическое действие.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Показания к применению

Симптоматическое лечение мышечно-суставных болей, профилактика пролежней.

Противопоказания

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, экзема, дерматиты, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения; склонность к судорожным реакциям, детский возраст до 18 лет.

Меры предосторожности

Только для наружного применения.

Перед применением нанести раствор на небольшой участок кожи. Обработка больших поверхностей тела запрещается. Лекарственное средство можно применять только на чистой неповреждённой коже. При нанесении лекарственного средства на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отёка или высыпаний на коже необходимо прекратить применение лекарственного средства и немедленно обратиться к врачу.

Не наносить лекарственное средство в области глаз, на слизистые оболочки. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза смыть большим количеством воды.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, прекратите применение лекарственного средства и обратитесь к врачу.

Избегайте вдыхания. После применения препарата необходимо тщательно помыть руки теплой водой с мылом.

Огнеопасно: Не использовать вблизи открытого огня. Не следует размещать или использовать лекарственное средство вблизи полированных или окрашенных поверхностей.

Храните в недоступном для детей месте.

Применение в период беременности и лактации.

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Применение при беременности и лактации допустимо только после консультации врача, если польза для матери превышает возможный риск для плода и ребёнка. Не наносить на кожу молочной железы во время лактации.

Применение у детей.

Лекарственное средство не рекомендовано применять детям до 18 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами.

Влияние лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами не изучалось. Рекомендовано соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с опасными механизмами.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.

При мышечно-суставных болях наносят на болезненные участки с помощью ватно-марлевого тампона 2-3 раза в день. Для профилактики образования пролежней наносят на локализованные участки покраснения кожи с помощью ватно-марлевого тампона 2-3 раза в день. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились. Не рекомендовано применять одновременно с другими средствами для наружного применения.

Побочное действие

Аллергические кожные реакции (крапивница, ~~нарывы, раздражение~~ кожа; головная боль, головокружение.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.


Передозировка

Случаи передозировки при наружном применении не зафиксированы. В случае приёма камфорного спирта внутрь, необходимо немедленно обратиться к врачу. При случайном приёме лекарственного средства внутрь регистрируют симптомы передозировки, характерные для отравления камфорой, которые включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома). Дозы камфоры, вызывающие летальность у взрослых составляют 50-500 мг/кг массы тела (перорально). Как правило, 2 г камфоры (перорально) вызывают серьезные токсические эффекты, а 4 г – потенциально смертельны.

Лечение симптоматическое, включая противосудорожную терапию, которая является основой лечения интоксикации камфорой. При передозировке не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма, который может привести к летальному исходу.

Упаковка

40 мл во флаконе из темного стекла. Флакон вместе с листком-вкладышем по применению в пачке из картона (упаковка №1).




Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня

Срок годности

5 лет.



Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.