


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК – ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства

ЛЕВОМИЦЕТИН

Торговое название: Левомецетин.

Международное непатентованное наименование: Chloramphenicol.

Форма выпуска: раствор спиртовой для наружного применения 2,5 мг/мл.

Описание: прозрачная, бесцветная или со слегка желтоватым оттенком жидкость с запахом спирта.

Состав: каждый флакон (25 мл) содержит *действующего вещества* – хлорамфеникола – 62,5 мг; *вспомогательные вещества:* спирт этиловый 70 % и воду очищенную.

Фармакотерапевтическая группа: Антибиотики для местного применения. Хлорамфеникол.

Код АТХ – D06AX02.

Показания к применению

Бактериальные инфекции кожи (пиодермия, фурункулез, карбункул) легкой степени, вызванные чувствительными микроорганизмами; обработка поверхностных повреждений (ссадин, царапин, укусов насекомых).

Противопоказания

Гиперчувствительность, угнетение костномозгового кроветворения, острая интермиттирующая порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная и/или почечная недостаточность, заболевания кожи (псориаз, экзе-

ма, грибковые поражения), острые воспалительные процессы с нарушениями целостности кожи; беременность, период кормления грудью, дети до 1 года.


Меры предосторожности

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови.

При нанесении на обширные поверхности с одновременным приемом этанола возможно развитие дисульфирамоподобных реакций (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлексорный кашель, судороги).

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, пожилых пациентов, пациентов с нарушением функции печени и почек.

Легко воспламеняется. Хранить в ~~плотно закрытой таре~~ ~~вдали~~ от источников возгорания. Не курить.



Способ применения и дозы

Местно наносят на пораженную поверхность несколько раз в сутки. Длительность применения зависит от характера патологического процесса, его выраженности, достигнутого эффекта.

Побочное действие

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, покраснения, отечность тканей. При наружном применении спирт этиловый частично всасывается в кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение ЦНС). Вдыхание паров этилового спирта может вызвать сонливость и головную боль. При длительном применении возможны нарушения со стороны крови, функции печени и почек, развитие дисбактериоза.

Передозировка

Не зарегистрировано. При передозировке препарата возможно раздражение кожи и слизистых оболочек, местные реакции в виде сыпи, зуда, покраснения и отечности тканей.

Беременность и кормление грудью

Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети

Не применяется у детей до 1 года.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами

Сведения о негативном влиянии на управление транспортом или другими механизмами отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимое взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно, вследствие незначительной системной абсорбции. Нежелательно одновременное применение с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, цитостатиками, производными пипразолина).

Упаковка

25 мл во флаконе из стекла. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.

