


НД РБ

2398Б-2022

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



НАЙЗ

Таблетки 100 мг в контурной ячейковой упаковке № 10х2

Перед тем, как начать принимать этот лекарственный препарат, внимательно прочтите листок-вкладыш, потому что он содержит важную информацию для Вас.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам придется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
- Этот лекарственный препарат прописан только Вам. Не передавайте его другим людям, т.к. он может нанести им вред, даже если у них такие же симптомы болезни, как у Вас.
- Если у Вас появятся побочные эффекты, включая любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше (см. Раздел 4), обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

Разделы листка-вкладыша

1. Что такое Найз и для чего он используется
2. Что следует знать перед приемом Найз
3. Как принимать Найз
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как хранить Найз
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

1. ЧТО ТАКОЕ НАЙЗ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Найз- нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с обезболивающим действием. Он используется для лечения острой и менструальной боли.

Перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом. Перед назначением препарата НАЙЗ врач оценивает соотношение потенциальной пользы, которую может дать вам это лекарство и риск нежелательных эффектов.

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ НАЙЗ

Не принимайте Найз:

- Если у вас у вас аллергия на нимесулид или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6);
- Если у вас имели место в прошлом гиперергические реакции (например, бронхоспазм, ринит, сыпь/зудящая сыпь (крапивница), одышка (астма), заложенность носа (носовые полипы), отек кожи или слизистых оболочек (отек вокруг глаз, отек лица, губ и горла, что может вызвать затруднение дыхания (ангионевротический отек)) в связи с приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВС;
- Если у вас были ранее желудочно-кишечные кровотечения или перфорации, связанные с предшествующей терапией НПВС;
- Если у вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, наличие в анамнезе язвы, перфорации или кровотечения в желудочно-кишечном тракте;
- Если у вас имели место в прошлом реакции со стороны печени на нимесулид;

30.09.2021

НД РБ

- Если вы принимаете препараты, вызывающие нежелательные реакции со стороны печени;
- Если вы принимаете алкоголь, наркотики;
- Если у вас имели место цереброваскулярные кровотечения или другие кровоизлияния, а также заболевания, сопровождающиеся кровоточивостью;
- Если у вас тяжелые нарушения свертывания крови;
- Если у вас тяжелая сердечная недостаточность;
- Если у вас тяжелая почечная недостаточность;
- Если у вас печеночная недостаточность;
- Если у вас есть симптомы простуды или гриппа;
- Если ваш возраст до 12 лет;
- Если вы находитесь в третьем триместре беременности;
- Если вы кормите грудью.

2398Б-2022
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Предупреждения

Прием Найз может быть связано с повышенным риском сердечного приступа или инсульта. Любой риск более вероятен при приеме высоких доз и длительном лечении. Поэтому, не следует превышать рекомендуемую дозу или продолжительность лечения.

Если у вас проблемы с сердцем, инсульт в анамнезе или вы считаете, что можете подвергнуться риску этих состояний (например, если у вас высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина или, если вы курите), необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом или фармацевтом.

Если во время лечения возникнут тяжелые аллергические реакции, необходимо прекратить прием Найз. Сообщите врачу при первом появлении высыпаний, поражений мягких тканей (слизистых оболочек) или любых других симптомов аллергии.

Немедленно прекратите лечение Найз, если у вас имеются признаки кровотечения (черный стул) или язвы (боль в животе).

Будьте особенно осторожны с Найз

- Если во время лечения нимесулидом появляются симптомы, указывающие на заболевание печени, необходимо прекратить прием нимесулида и немедленно сообщить об этом врачу. Симптомы, указывающие на проблемы с печенью - потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, постоянная усталость и темная моча.
- Если у вас язва желудка, желудочное или кишечное кровотечение или воспалительное заболевание кишечника в анамнезе, такое как язвенный колит или болезнь Крона, вы должны сообщить своему врачу, прежде чем принимать Найз.
- Если у вас наблюдаются лихорадка и/или симптомы гриппа (общая болезненность, недомогание, озноб или дрожь) следует прекратить прием препарата и сообщить своему врачу.
- Если вы страдаете проблемами с сердцем, высоким кровяным давлением, проблемами кровообращения или почек, вы должны сообщить об этом врачу перед приемом Найз.
- Если вы пожилой человек, ваш врач должен регулярно наблюдать вас, чтобы убедиться, что Найз не вызывает каких-либо проблем с желудком, почками, сердцем или печенью.
- Если вы планируете беременность, сообщите об этом своему врачу, поскольку Найз может снизить fertильность.

Другие лекарственные препараты и Найз

Если вы принимаете какие-либо из следующих лекарственных препаратов, которые могут взаимодействовать с Найз:

- Кортикоステроиды (препараты, применяемые для лечения воспалительных состояний);
- Препараты для разжижения крови (антикоагулянты, например, варфарин или антиагреганты, аспирин или другие салицилаты);

30.09.2021

2398Б-2022

- Антигипертензивные или диуретические средства (препараты для снижения давления или нарушений сердечной);
- Литий, используемый для лечения депрессии и подобных заболеваний;
- Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (препараты, применяемые при лечении депрессии);
- Метотрексат (препарат, применяемый для лечения ревматоидного артрита и лечения рака);
- Циклоспорин (препарат, применяемый после трансплантации или для лечения системных заболеваний).

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Прежде чем принимать Найз, убедитесь, что ваш лечащий врач или фармацевт знает, что вы принимаете эти лекарственные препараты.

Беременность и кормление грудью

Прежде чем принимать Найз проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

- Найз нельзя применять в последнем триместре беременности. Это может вызвать проблемы для ребенка и при родах.
- Если вы планируете беременность, сообщите об этом своему врачу, поскольку Найз может снизить fertильность.
- Если вы находитесь в первом или втором триместре беременности, не превышайте дозу и продолжительность лечения.

Найз не следует применять в период грудного вскармливания.

Управление транспортом и работа с механизмами

Не управляйте транспортом и не работайте с механизмами, если Найз вызывает у вас головокружение или сонливость.

3. КАК ПРИНИМАТЬ НАЙЗ

Всегда принимайте Найз точно по назначению врача. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Чтобы уменьшить нежелательные реакции, следует использовать минимальную эффективную дозу в течение как можно более короткого периода времени для уменьшения наличия симптомов. Обычная доза - одна таблетка 100 мг два раза в день после еды. Используйте Найз как можно более короткий период времени и не более 15 дней на однократный курс лечения.

Если вы приняли больше Найз, чем предусмотрено:

Если вы приняли или думаете, что приняли больше Найз, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к врачу. В случае передозировки скорее всего разовьется один следующих симптомов: сонливость, тошнота, боль в желудке, язва желудка, затрудненное дыхание.

Если вы забыли принять Найз:

Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и все лекарственные препараты, Найз может вызывать нежелательные реакции, но не у всех. При появлении любого из следующих симптомов прекратите прием препарата и сообщите об этом врачу, так как это может указывать на редкую серьезную нежелательную реакцию, требующую внимания:

- дискомфорт или боль в желудке, потеря аппетита, тошнота (плохое самочувствие), рвота, желудочное или кишечное кровотечение, или черный стул;
- кожные реакции, такие как сыпь или покраснение;
- хрипы или затрудненное дыхание;
- пожелтение кожи или глаз (желтуха);

30.09.2021

- неожиданное изменение количества или цвета мочи;
- отек лица, ступней или ног;
- утомляемость.



Общие нежелательные реакции нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП):
Использование некоторых НПВП может быть связано с несколько повышенным риском артериальной окклюзии (тромбоз), такой как сердечный приступ (инфаркт миокарда) или инсульт, особенно при приеме в высоких дозах и при длительном лечении.

Сообщалось о задержке жидкости (отеках), давлении в связи с лечением НПВП, высоком кровяном давлении (гипертония) и сердечной недостаточности.

Наиболее часто наблюдаемые нежелательные реакции касаются желудочно-кишечного тракта:

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

- перфорация стенок кишечника или желудка или кишечное кровотечение (иногда со смертельным исходом, особенно у пожилых пациентов).

Нежелательные реакции, которые могут возникнуть при приеме Найз:

- Часто (могут наблюдаться более чем у 1 из 100 пациентов): диарея, тошнота, рвота, незначительные изменения крови и показателей функции печени.

- Нечасто (могут наблюдаться у 1 из 100 пациентов): одышка, головокружение, усиление артериального давления, запор, метеоризм, изжога (гастрит), зуд, сыпь, повышенное потоотделение, отек, кровотечение из желудка или кишечника; язва двенадцатиперстной кишки или желудка и прободные язвы.

- Редко (могут наблюдаться у 1 из 1000 пациентов): анемия, снижение лейкоцитов в крови, повышение некоторых лейкоцитов (эозинофилов) в крови, изменение артериального давления, кровотечение, боль при мочеиспускании или задержка мочи, кровь в моче, повышение артериального давления, калий в крови, чувство тревоги или нервозности, кошмары, помутнение зрения, учащенное сердцебиение, болезни сердца, гиперемия, покраснение кожи, воспаление кожи (дерматит), недомогание, усталость.

- Очень редко (могут наблюдаться у 1 пациента из 10000): тяжелые кожные реакции (известные как мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), вызывающие кожные высыпания и сильный дискомфорт; почечная недостаточность или воспаление (нефрит); расстройства функции мозга (энцефалопатия); снижение количества тромбоцитов в крови, что вызывает подкожное кровотечение, черный стул из-за кровотечения; воспаление печени (гепатит), иногда очень тяжелое, вызывающее желтуху и блокировку оттока желчи; аллергии, в том числе тяжелые реакции с коллапсом и затрудненным дыханием, астма, уменьшение температуры тела, головокружение, головная боль, бессонница, боли в желудке; несварение желудка, изжога, кожные высыпания и зуд (крапивница); отек лица и прилегающих участков, нарушения зрения.

Лекарственные препараты, такие как Найз, могут быть связаны с несколько повышенным риском сердечного приступа или инсульта.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным в Республике Беларусь (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата

30.09.2021

5. КАК ХРАНИТЬ НАЙЗ

2398Б-2022

Храните Найз при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Храните в недоступном для детей месте.



Не используйте Найз после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте лекарственный препарат в канализацию или бытовые отходы. Спросите у фармацевта, как утилизировать лекарственный препарат, который Вы больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Что содержит Найз**

Действующее вещество – нимесулид 100 мг

Вспомогательные вещества- безводный кальция гидрофосфат, микрокристаллическая целлюлоза, крахмал кукурузный, натрия крахмалгликолят (тип А), стеарат магния, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк очищенный.

Как выглядит Найз и что содержится в упаковке

Таблетки цвета от практически белого до желтого, круглые, с ровной выпуклой поверхностью с обеих сторон

Упаковка: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия отпуска:

По рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Д-р Редди's Лабораторис Лтд, 8-2-337, Роад № 3, Баньяра Хиллс, Хайдерабад, Индия, тел. +91 40 4900 2900, факс +91 40 4900 2999, электронная почта: mail@drreddys.com

Производитель, осуществляющий выпускающий контроль:

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»,

Республика Беларусь. 222603, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1.