


Листок-вкладыш: информация для потребителя
Незофарм®, 20 мг/г, шампунь лекарственный
 кетоконазол

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Незофарм®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Незофарм®.
3. Применение препарата Незофарм®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Незофарм®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. Что из себя представляет препарат Незофарм®, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Незофарм®, шампунь лекарственный, предназначен для наружного применения. Его действующее вещество кетоконазол обладает противогрибковым действием, проявляет активность против некоторых видов дрожжевых грибков. Шампунь Незофарм® применяют для наружного лечения и профилактики заболеваний, вызванных грибками (также называемых микозами).

Лекарственный препарат Незофарм® применяется для местного лечения у взрослых и подростков старше 12 лет при перхоти, отрубевидном лишае (мелкие пятна красновато-коричневого цвета на коже), себорейном дерматите (воспаление кожи в результате повышенного выделения качественно изменённого сала и активного воздействия дрожжевых грибков). Эти заболевания часто сопровождаются кожным зудом.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Незофарм®

Не применяйте препарат Незофарм®:

- если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) на кетоконазол, а также на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас повышенная чувствительность к лекарственным препаратам, содержащим производное имидазола (спросите об этом своего врача или работника аптеки).

Особые указания и меры предосторожности

1610 Б-2016

Перед применением препарата Незофарм® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как применять препарат Незофарм®:

- если Вы применяете местно лосьон или крем, который содержит глюкокортикоиды (бетаметазон или гидрокортизон). Необходимо снизить дозу этих препаратов с постепенной отменой в течение 2-3 недель перед началом применения шампуня Незофарм®. Режим отмены в каждом конкретном случае определит Ваш лечащий врач.

Дети

Препарат Незофарм® не предназначен для применения у детей в возрасте младше 12 лет.

Другие препараты и препарат Незофарм®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При местном применении кетоконазола взаимодействия с другими препаратами не отмечалось.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или работником аптеки.

Адекватных данных о применении шампуня, содержащего кетоконазол, беременными женщинами нет.

Нет никаких известных рисков, связанных с применением препарата Незофарм® во время беременности или кормления грудью, так как при наружном применении кетоконазол практически не всасывается в системный кровоток.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Препарат Незофарм® не оказывает воздействия на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Вспомогательные вещества

Препарат Незофарм® содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Этот препарат содержит 10,0 мг бензилового спирта в 1 г. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и легкое местное раздражение.

3. Применение препарата Незофарм®

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемые дозы

Отрубевидный (разноцветный) лишай

- для лечения применяйте один раз в день в течение 1-5 дней.

Себорейный дерматит и перхоть

- для лечения применяйте два раза в неделю в течение 2-4 недель;
- для профилактики применяйте еженедельно или 1 раз в две недели.

Применение у детей

Эффективность и безопасность применения у детей до 12 лет не установлена.

Продолжительность лечения

1610Б-2016

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Продолжительность лечения определит Ваш лечащий врач. Не превышайте рекомендованную Вашим врачом частоту применения препарата Незофарм®.

Способ применения

Для наружного применения.

Нанесите шампунь на пораженные участки кожи или волосистой части головы и оставьте на 5-10 минут, затем промойте водой. Обратите внимание, что необходимо вымыть не только волосы, но и кожу.

Если препарат Незофарм® попал Вам в глаза

Следует избегать попадания препарата в глаза. При попадании шампуня в глаза необходимо промыть их водой.

Применение Вашего обычного шампуня

Если Вам необходимо вымыть волосы между применением препарата Незофарм®, Вы можете использовать свой обычный шампунь.

Если у Вас длинные или густые волосы, Вы можете вымыть их обычным шампунем, а затем применить препарат Незофарм®.

Если Вы применили препарата Незофарм® больше, чем следовало

При использовании препарата Незофарм® развития передозировки не предполагается, так как шампунь предназначен только для наружного применения. При случайном проглатывании рекомендуется срочно обратиться к врачу. В этом случае врач может назначить Вам поддерживающую или симптоматическую терапию. Для предотвращения аспирации запрещается вызывать рвоту и промывать желудок.

Если Вы забыли применить Незофарм®

Если Вы забыли применить препарат Незофарм®, сделайте это, при необходимости, как только вспомните. Не применяйте препарат дважды, чтобы компенсировать пропущенное применение.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Незофарм® может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

Если у Вас развилась любая из приведенных ниже нежелательных реакций, немедленно прекратите применение препарата Незофарм® и обратитесь к врачу:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): раздражение и покраснение кожи в месте применения шампуня в течение первых нескольких дней его применения;

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): аллергические реакции, отек лица, губ, языка, которые сопровождаются затруднением дыхания и глотания; шелушение кожи или появление волдырей в месте применения шампуня.

Другие нежелательные реакции, которые могут возникать при применении лекарственного препарата Незофарм®:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): воспаление волосяных фолликулов, повышенная слезоточивость, выпадение и истончение волос, сухость кожи, сыпь, ощущение жжения

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): изменение вкуса, раздражение глаз, акне (угри), шелушение кожи.

Частота неизвестна (частота встречаемости не может быть оценена на основе имеющихся данных): изменение цвета волос, зудящая красная сыпь.

1610Б-2016

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬСообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, про консультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение лекарственного препарата Незофарм®

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Срок годности 2 года. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. Храните препарат в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре не выше 25°C.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Незофарм® содержит в качестве действующего вещества кетоконазол.

В 1 г шампуня содержится 20 мг кетоконазола.

Вспомогательные вещества: натрия лауретсульфат, двунатриевая соль лаурилэтокси-сульфосукцината, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, гидролизованный коллаген, пропиленгликоль, натрия хлорид, бензиловый спирт, натрия гидроксид, Понсо 4R (E124), отдушка Рико 2606, вода очищенная.

Внешний вид препарата Незофарм® и содержимое упаковки

Шампунь лекарственный. Розовато-оранжевая вязкая жидкость с ароматным запахом.

По 30 г или 50 г в тубы из полимерных материалов или тубы из комбинированного материала с бушонами. Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Фармтехнология»

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон: (017) 309 44 88. E-mail: ft@ft.by.

Данный листок-вкладыш пересмотрен