



**Листок-вкладыш: информация для потребителя**  
**Пиколакс<sup>®</sup>, капли для приема внутрь 7,5 мг/мл**  
**натрия пикосульфат моногидрат**

**Прочтайте внимательно листок-вкладыш перед началом применения лекарственного препарата, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда применяйте лекарственный препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его заново.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если Ваше состояние не улучшается или ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что представляет собой лекарственный препарат Пиколакс<sup>®</sup>, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Пиколакс<sup>®</sup>
3. Как применять лекарственный препарат Пиколакс<sup>®</sup>
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение лекарственного препарата Пиколакс<sup>®</sup>
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что представляет собой лекарственный препарат Пиколакс<sup>®</sup>, и для чего его применяют**

Лекарственный препарат Пиколакс<sup>®</sup> содержит действующее вещество натрия пикосульфат. Натрия пикосульфат относится к группе контактных слабительных препаратов, действие которых приводит к накоплению воды и электролитов в просвете толстой кишки, в результате чего происходит ускорение продвижения кишечного содержимого и размягчение стула.

Препарат Пиколакс<sup>®</sup> применяется для кратковременного применения при запорах и заболеваниях, требующих облегчения дефекации.

Препарат Пиколакс<sup>®</sup> предназначен для применения у взрослых и у детей в возрасте 4 года и старше.

*Как и другие слабительные препараты, лекарственный препарат Пиколакс<sup>®</sup> не должен применяться в течение более 7 дней. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 7 дней, необходимо обратиться к врачу.*

**2. О чем следует знать перед применением лекарственного препарата Пиколакс<sup>®</sup>**  
**Не применяйте препарат Пиколакс<sup>®</sup>:**

- если у Вас отмечается повышенная чувствительность к натрия пикосульфату или к любому из вспомогательных компонентов лекарственного препарата (см. раздел 6);
- если у Вас стеноз кишечника или кишечная непроходимость;
- если у Вас острые абдоминальные состояния, которые могут сопровождаться следующими симптомами: сильная боль в животе, повышение температуры, тошнота и рвота (например, аппендицит);

- если у Вас тяжелое обезвоживание;
- в возрасте до 4 лет.

### **Особые указания и меры предосторожности при применении**

*Перед началом применения препарата Пиколакс® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.*

Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как применять препарат Пиколакс®, в следующих случаях:

- если Вы пациент пожилого возраста;
- если у Вас имеются сопутствующие заболевания;
- если Вы страдаете хроническими или рецидивирующими запорами. Следует повторно обратиться к врачу, если:
  - запор длится более 2 недель, несмотря на лечение, коррекцию физической активности, питания;
  - изменения частоты и других характеристик акта опорожнения кишечника делятся в течение 2 недель и более;
  - прием натрия пикосульфата не приносит желаемого эффекта.

### **Аллергические реакции**

При применении лекарственного препарата в отдельных случаях могут возникать тяжелые аллергические реакции (см. раздел 4). Данные реакции возникают внезапно, в самое ближайшее время (несколько секунд, минут) после применения лекарственного препарата и могут быстро нарастать. Могут появиться:

- сыпь, зуд;
- отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить.

Может развиться один симптом или одновременно несколько из указанных симптомов.

*Если Вы заметили возникновение данных симптомов либо других симптомов, которые, по Вашему мнению, указывают на развитие аллергической реакции, необходимо немедленно прекратить применение лекарственного препарата и сразу же обратиться за медицинской помощью, так как такие внезапно развивающиеся аллергические реакции могут угрожать жизни.*

Частое, длительное или избыточное применение слабительных средств, в том числе пикосульфата натрия, может привести к:

- нарушению баланса жидкости и электролитов в организме (снижение уровня калия в крови может привести к нарушению функций сердечно-сосудистой или нервной системы);
- возникновению зависимости, что приводит к потребности в постепенном увеличении принимаемой дозы, хроническому запору и нарушению функции кишечника. В таких случаях при прекращении применения слабительного средства симптомы запора могут возобновиться и/или усиливаться.

Немедленно обратитесь к врачу, если после применения препарата у Вас наблюдается кровотечение из прямой кишки или отсутствие дефекации.

Сообщалось о приступах головокружения и кратковременных приступах потери сознания (обморока) у пациентов после применения слабительных средств, содержащих натрия пикосульфат, что, вероятно, может быть связано либо с чрезмерным напряжением при дефекации, либо с реакцией на боли в животе, из-за запора.

### **Дети**

Детям в возрасте от 4 лет можно принимать лекарственный препарат только по назначению врача. Применение препарата у детей до 4 лет противопоказано.

**Другие препараты и препарат Пиколакс®**

*Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.*

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы применяете следующие препараты:

- антибиотики;
- диуретики (мочегонные препараты);
- кортикостероиды;
- сердечные гликозиды;
- пероральные антикоагулянты (препараты для разжижения крови);
- препараты для лечения сахарного диабета.

После приема какого-либо лекарственного препарата необходимо выдержать интервал не менее 2-х часов, прежде чем принять препарат Пиколакс®, и не менее одного часа после приема антацидов (препарата для облегчения изжоги).

**Препарат Пиколакс® с пищей и напитками**

Молоко может повлиять на эффективность слабительного препарата. После того, как Вы выпили молоко, необходимо выдержать интервал не менее одного часа, прежде чем принять препарат Пиколакс®.

**Беременность и грудное вскармливание**

*При беременности, вероятной беременности или планировании беременности, а также при кормлении грудью Вам следует обратиться к врачу перед тем, как применять лекарственный препарат Пиколакс®.*

*Если в процессе применения препарата Вы предположите или установите, что Вы беременны, проконсультируйтесь с врачом насчет возможности продолжения лечения данным препаратом.*

Препарат Пиколакс® не следует применять во время беременности.

Применение препарата Пиколакс® в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача.


**Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

При применении препарата может возникнуть головокружение или обморок. Если у Вас возникали ранее при применении натрия пикосульфата спастические боли в животе, Вы должны избегать потенциально опасных видов деятельности, таких как управление транспортными средствами или работа с механизмами.

**Вспомогательные вещества**

В одной капле лекарственного препарата Пиколакс® содержится 30,65 мг сорбитола, что соответствует 18,39 мг/кг массы тела при применении максимальной суточной дозы препарата (30 капель) у взрослых со средней массой тела 50 кг или 28,74 мг/кг массы тела при применении максимальной суточной дозы препарата (15 капель) у детей в возрасте 4 года со средней массой тела 16 кг. Сорбитол – источник фруктозы. Если врач установил ранее у Вас (у Вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров или у Вас (у Вашего ребенка) была диагностирована наследственная непереносимость фруктозы, редкое генетическое нарушение, при котором фруктоза не может быть расщеплена, обратитесь к лечащему врачу перед тем, как начать применять данный лекарственный препарат.

В одной капле лекарственного препарата Пиколакс® содержится 0,095 мг натрия бензоата, что соответствует 0,057 мг/кг массы тела при применении максимальной суточной дозы препарата (30 капель) у взрослых со средней массой тела 50 кг или 0,089 мг/кг массы тела



при применении максимальной суточной дозы препарата (15 капель) у детей в возрасте 4 года со средней массой тела 16 кг.

### **3. Как применять лекарственный препарат Пиколакс®**

*Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.*

#### **Рекомендуемая доза**

##### **Взрослые**

Рекомендуется начинать с наименьшей эффективной дозы. Эффективной считается та доза, которая приводит к легкой эвакуации мягкого по консистенции стула.

Если не назначено иное, рекомендуется начинать прием лекарственного препарата с дозы в 3,5-4 мг натрия пикосульфата (11-12 капель лекарственного препарата) 1 раз в сутки. Если слабительный эффект недостаточный, дозу можно постепенно повысить до 10 мг натрия пикосульфата (30 капель лекарственного препарата) 1 раз в сутки.

*Не следует превышать максимальную суточную дозу препарата в 10 мг натрия пикосульфата (30 капель).*

##### **Дети**

Для детей в возрасте 4 года и старше применение препарата должно быть только по назначению врача. Рекомендуемая доза составляет 2,5-5 мг натрия пикосульфата (7-15 капель лекарственного препарата) 1 раз сутки. Максимальная суточная доза составляет 2,5-5 мг натрия пикосульфата.

Применение лекарственного препарата у детей до 4 лет противопоказано.

#### **Способ применения**

Для приема внутрь.

Необходимое количество капель лекарственного препарата рекомендуется разбавлять в жидкости.

Достаточное количество жидкости в рационе способствует более быстрому достижению желаемого терапевтического эффекта от приема лекарственного препарата.

Рекомендуется принимать Пиколакс® вечером, так как после приема действие препарата наступает через 10-12 часов.

Не рекомендуется применять капли регулярно, каждый день или длительно (более 7 дней) без консультации врача.

#### ***Если Вы применили большее количество лекарственного препарата, чем следовало***

Если Вы или Ваш ребенок применили большее количество препарата, чем следовало, обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи/больницы. По возможности возмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш.

Возможные признаки передозировки: водянистый стул (диарея), боли в животе спастического характера и потеря жидкости, калия и других электролитов. Сообщалось о случаях развития ишемии слизистой толстой кишки (толстый отдел кишечника недостаточно снабжается кислородом из-за сниженного кровообращения в его стенках).

Как и любое слабительное средство, натрия пикосульфат при длительном его приеме в высоких дозах может привести к развитию хронической диареи (жидкий стул), возникновению болей в животе, снижению уровня калия в крови (гипокалиемия), увеличению образования гормона альдостерона надпочечниками (вторичный гиперальдостеронизм), который может привести к снижению уровня калия в сыворотке крови, и камней в почках. Также длительное применение натрия пикосульфата может привести к повреждению канальцев почек, снижению кислотности крови (метаболический алкалоз) и слабости в мышцах, обусловленной сниженным уровнем калия в крови (гипокалиемия).

***Если Вы забыли принять лекарственный препарат Пиколакс®***

Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной. Примите рекомендованную Вам следующую дозу в обычное время.

***При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки.***

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно другим лекарственным препаратам Пиколакс® может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

**Наиболее серьезные нежелательные реакции**

Если Вы заметили у себя появление каких-либо из следующих реакций, ***прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу:***

- ангионевротический отек (частота возникновения неизвестна – невозможно определить частоту на основании имеющихся данных). Возможные проявления: отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить.

**Другие возможные нежелательные реакции**

Очень частые нежелательные реакции (могут наблюдаться не менее чем у 1 из 10 человек):

- диарея (жидкий стул).

Частые нежелательные реакции (могут наблюдаться менее чем у 1 из 10 человек):

- колики в животе, боли и дискомфорт в животе.

Нечастые нежелательные реакции (могут наблюдаться менее чем у 1 из 100 человек):

- головокружение\*;
- рвота, тошнота.

Нежелательные реакции с неизвестной частотой:

- аллергические реакции;
- обморок\*;
- кожные реакции, такие как лекарственная сыпь, зуд.

\*Головокружение и обморок, возникающие после приема натрия пикосульфата, вероятно, связаны с развитием особой реакции нервной системы (парасимпатической реакции) (например, вследствие спазмов в животе) или с чрезмерным напряжением при акте дефекации.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (<https://www.rceth.by/>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**5. Хранение лекарственного препарата Пиколакс®**

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Срок годности: 3 года. Не использовать лекарственный препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.  
Срок хранения после вскрытия: 6 месяцев.

НД РБ

0900Б-2021

**6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

Препарат Пиколакс® содержит в качестве действующего вещества натрия пикосульфат моногидрат.

В 1 мл раствора, что соответствует 21 капле, содержится 7,5 мг натрия пикосульфата моногидрата.

*Вспомогательные вещества:* натрия бензоат (Е211), натрия цитрат, сорбитола раствор некристаллизующийся, лимонная кислота моногидрат, вода очищенная.

***Внешний вид лекарственного препарата Пиколакс® и содержимое упаковки***

Капли для приема внутрь:

Прозрачный раствор, слегка вязкий, от бесцветного до желтоватого или слегка желтовато-коричневого цвета.

По 15 мл или 30 мл во флаконах из литого коричневого стекла, укупоренных крышками винтовыми в комплекте с кольцом первого вскрытия/капельницей.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

***Условия отпуска из аптек***

Без рецепта врача.

***Держатель регистрационного удостоверения и производитель***

ООО «Фармтехнология»

Республика Беларусь

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88.

E-mail: ft@ft.by.

***Листок-вкладыш пересмотрен***

08/2021

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь