

УНОПРОСТ, 320 мг, капсулы
Сабаля мелкопильчатого липидостероловый экстракт

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
 - Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
 - Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
 - Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Унопрост, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Унопрост.
3. Применение препарата Унопрост.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Унопрост.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Удостоверение о согласовании
 Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 от « 10 » 05 2023 г. № 653

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ УНОПРОСТ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Унопрост является растительным лекарственным препаратом, содержит действующее вещество Сабаля мелкопильчатого липидостероловый экстракт.

Препарат Унопрост применяется у мужчин с затрудненным мочеиспусканием при нарушениях со стороны предстательной железы (нарушения мочеиспускания при доброкачественном увеличении предстательной железы 1–2 стадии).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА УНОПРОСТ

Не применяйте препарат Унопрост если у Вас:

- аллергия на Сабаль мелкопильчатый или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Унопрост проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Прием лекарственного препарата натощак может вызвать тошноту.

Перед началом лечения лекарственным препаратом Унопрост, а также регулярно во время лечения препаратом необходимо проведение обследования с целью

раннего выявления карциномы простаты (злокачественного заболевания предстательной железы).

Препарат Унопрост следует применять с осторожностью в следующих случаях:

- если Вы одновременно принимаете некоторые другие лекарственные препараты. В таком случае, обратите внимание на подробную информацию, приведенную в разделе «Другие препараты и препарат Унопрост»);
- если у Вас заболевание, при котором повышена склонность к кровотечениям, а также если планируются хирургические или стоматологические вмешательства, поскольку препарат Унопрост может повышать склонность к кровотечениям;
- если у Вас очень высокое артериальное давление (в ходе клинических исследований были описаны случаи повышения артериального давления у отдельных пациентов). Необходимо регулярно контролировать артериальное давление.

Прием препарата Унопрост способствует только облегчению симптомов при увеличении предстательной железы. Он не приводит к обратному развитию увеличения предстательной железы. В связи с этим Вам следует регулярно обращаться за консультацией к своему врачу.

В особенности Вам следует обратиться к своему врачу в следующих случаях:

- при приеме препарата у Вас наблюдается ухудшение симптомов, например, постоянное выделение мочи в виде капель (недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря);
- при наличии крови в моче;
- при болезненном мочеиспускании
- при болезненных позывах к мочеиспусканию и внезапной задержке мочеиспускания (задержке мочи).

Вспомогательные вещества

Препарат Унопрост содержит натрия бензоат Е 211 и краситель кармуазин Е 122, которые могут вызвать аллергические реакции.

Другие препараты и препарат Унопрост

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами на настоящий момент изучено недостаточно.

При одновременном приеме с препаратом Унопрост усиливается действие:

- препаратов, тормозящих свертываемость крови (например, фенпрокумон, варфарин, клопидогрел, ацетилсалicyловая кислота и другие нестероидные противоревматические средства);
- гормональных препаратов, угнетающих выработку андрогенов (вид половых гормонов) – антиандrogenные препараты.

При приеме андрогенов (вид половых гормонов) в терапевтических дозах их действие может ослабляться.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Лекарственный препарат предназначен только для мужчин. Препарат Унопрост противопоказан женщинам во время беременности и кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Унопрост не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

1192Б-2018

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА УНОПРОСТ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза: применять по 1 капсуле 1 раз в день в одно и то же время.

Продолжительность курса лечения составляет не менее 3 месяцев. Длительность лечения и необходимость в проведении повторных курсов определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

Применение у детей и подростков

Лекарственный препарат не следует применять у детей и подростков до 18 лет.

Способ применения

Мягкую капсулу глотают целиком во время еды и запивают достаточным количеством жидкости.

Если у Вас есть ощущение, что действие препарата Унопрост слишком слабое или слишком сильное, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

Если Вы приняли препарата Унопрост больше, чем следовало

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не отмечалось. Однако, в любом случае сообщите об этом лечащему врачу.

Если Вы забыли принять препарат Унопрост

Примите следующую дозу в назначенное время. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Унопрост

Не прекращайте прием препарата, не посоветовавшись с Вашим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):


- повышение артериального давления;
- тошнота, рвота, боли в желудке или области живота, понос (диарея).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции или реакции повышенной чувствительности;
- при одновременном приеме других лекарственных препаратов могут возникать кровотечения (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях. Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.



1192Б-20



5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА УНОПРОСТ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Унопрост содержит

Действующее вещество: сабаля мелкопильчатого липидостероловый экстракт – 320 мг.

Оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, натрия бензоат Е 211, титана диоксид Е 171, вода очищенная, красный очаровательный Е 129, кармуазин Е 122, железа оксид черный Е 172, железа оксид красный Е 172.

Внешний вид препарата и содержимое упаковки

Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, с непрозрачной двухцветной оболочкой, окрашенной в черный/красный цвета.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из бесцветной прозрачной пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной, по 3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем укладывают в пачку из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,

220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

Телефон/факс: +375 17 276-01-59

Электронная почта: info@mic.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Дата последнего пересмотра:

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на официальном сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» www.rceth.by.