


НД РБ

0138 Б-2018



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ХОЛЕНЗИМ, 100 мг + 200 мг, таблетки, покрытые оболочкой
(желчь + порошок поджелудочной железы и слизистых тонких кишок)**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат ХОЛЕНЗИМ и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата ХОЛЕНЗИМ
3. Прием препарата ХОЛЕНЗИМ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ХОЛЕНЗИМ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ХОЛЕНЗИМ
И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат ХОЛЕНЗИМ содержит действующие вещества желчь сухую, порошок поджелудочной железы высушенной и слизистых оболочек тонких кишок высушенных. ХОЛЕНЗИМ принадлежит к группе препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Препарат улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, нормализует процесс пищеварения, обладает желчегонным действием. Препарат ХОЛЕНЗИМ применяется у взрослых и детей после 12 лет в качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта:

- хронический гепатит;
- хронический некалькулезный холецистит;
- хронический панкреатит;
- гастрит;
- колит;
- метеоризм;
- диарея неинфекционного генеза.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ХОЛЕНЗИМ
Не принимайте препарат ХОЛЕНЗИМ:**

- если у вас аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе б);

- если у вас острый панкреатит;
- если у вас обострение хронического панкреатита;
- если у вас обтурационная желтуха.

ХОЛЕНЗИМ противопоказан к приему у детей до 12 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ХОЛЕНЗИМ проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Если у вас желчнокаменная болезнь, препарат рекомендуется применять с осторожностью, только после консультации врача и проведения ультразвукового исследования.

Не следует принимать препарат с другими антацидными средствами.

ХОЛЕНЗИМ содержит сахар. Прежде чем принимать лекарственный препарат убедитесь, что лечащий врач знает, что у вас редко встречающаяся наследственная непереносимость фруктозы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. Вам следует принимать препарат с осторожностью, если у вас сахарный диабет или вы находитесь на диете с пониженным содержанием углеводов.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 12 лет вследствие вероятной небезопасности.

Другие препараты и препарат ХОЛЕНЗИМ

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это относится и к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без рецепта.

Не принимайте лекарственный препарат ХОЛЕНЗИМ с антацидными средствами, которые содержат карбонат кальция и/или магния гидроксид. Это может привести к снижению эффективности лекарственного препарата. При длительном применении возможно снижение всасывания железа.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

ХОЛЕНЗИМ допускается принимать во время беременности, а также в период кормления грудью при острой необходимости после консультации врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При приеме препарата ХОЛЕНЗИМ в рекомендуемой дозе и при рекомендованной продолжительности терапии влияния на управление транспортными средствами и на работу механизмами не ожидается.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ХОЛЕНЗИМ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет: 1 таблетка 1-3 раза в сутки.

Длительность применения препарата определяет врач в зависимости от вашего состояния.

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение у детей и подростков

ХОЛЕНЗИМ не следует применять у детей в возрасте до 12 лет, в связи с риском, связанным с опасениями относительно безопасности.

Способ применения

Внутрь, после еды, с большим количеством воды. Не жевать.

Если вы приняли препарата ХОЛЕНЗИМ больше, чем следовало

При длительном применении высоких доз возможны тошнота, изжога, диарея, кожный зуд, повышение уровня трансаминаз в крови.

Если вы забыли принять препарат ХОЛЕНЗИМ

В случае пропуска приема дозы лекарственного препарата следует принять следующую дозу в определенное время. Не следует принимать двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата ХОЛЕНЗИМ

Ваш лечащий врач определит, когда вам следует прекратить лечение. Если вы желаете закончить прием препарата раньше, обратитесь к врачу, чтобы обсудить другие варианты лечения.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, ХОЛЕНЗИМ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Некоторые нежелательные реакции можно свести к минимуму, если принимать наименьшую дозу в течение минимального периода времени, необходимого для облегчения симптомов. Если любая нежелательная реакция становится серьезной или вы замечаете любую нежелательную реакцию, не указанную в данном листке-вкладыше, сообщите об этом врачу или работнику аптеки.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции (слезотечение, чихание);
- покраснение кожи;
- сыпь;
- тошнота;
- изжога;
- диарея;
- повышение активности печеночных ферментов в крови.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ХОЛЕНЗИМ

Храните в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Храните в недоступном и невидном для детей месте.

Храните в оригинальной упаковке.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не применяйте препарат, если вы заметили, что упаковка, в которой находится препарат, повреждена.

НД РБ
0138 Б-2018

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат ХОЛЕНЗИМ содержит

Действующими веществами являются желчь сухая и порошок поджелудочной железы высушенной и слизистых оболочек тонких кишок высушенных.

ХОЛЕНЗИМ, 100 мг + 200 мг: каждая таблетка содержит 100 мг желчи сухой и 200 мг порошка поджелудочной железы высушенной и слизистых оболочек тонких кишок высушенных.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются:

повидон К-25, кальция стеарат;

состав оболочки: сахар белый, магния карбонат основной легкий, кремния диоксид коллоидный безводный, титана диоксид (Е 171), коповидон, воск пчелиный желтый.

Внешний вид препарата ХОЛЕНЗИМ и содержимое упаковки

ХОЛЕНЗИМ, таблетки, покрытые оболочкой, белого цвета, со специфическим запахом, с двояковыпуклой поверхностью.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке (блистере) из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги. Пять блистеров вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com



За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.