


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для пациентов)  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**ХОЛЕНЗИМ**

**Торговое название:** Холензим.

**Международное непатентованное название:** нет.

**Форма выпуска:** таблетки, покрытые оболочкой.

**Описание:** таблетки, покрытые оболочкой, белого цвета, со специфическим запахом, с двояковыпуклой поверхностью.

**Состав:** каждая таблетка содержит *активные вещества*: желчи сухой – 100 мг; порошка поджелудочной железы высущенной и слизистых оболочек тонких кишок высущенных – 200 мг; *вспомогательные вещества*: сахар белый, магния карбонат основной легкий (E-200), повидон K-25 (E-1201), кремния диоксид коллоидный безводный (E-551), титана диоксид (E-171), коповидон, кальция стеарат (E-470), воск пчелиный желтый (E-901).

**Фармакотерапевтическая группа:** Средства на основе желчных кислот.

**Код АТС:** A05AA.

**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат животного происхождения, улучшающий функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, нормализующий процесс пищеварения. Обладает желчегонным действием. Входящие в состав препарата пищеварительные ферменты (трипсин, амилаза и липаза) и желчь облегчают переваривание белков, углеводов и жиров, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

**Показания к применению**

В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта: хронический гепатит, хронический некалькулезный холецистит, хронический панкреатит, гастрит, колит; метеоризм, диарея неинфекционного генеза.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1-3 раза в сутки.

Применять таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости.

Не рекомендуется превышать суточную дозу.

**Побочное действие**

Возможны реакции, обусловленные повышенной чувствительностью (чихание, слезотечение, покраснение кожи, кожная сыпь и др.). При их появлении необходимо прекратить употребление препарата и обратиться к врачу.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая

сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территориях государств (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», [www.rceih.by](http://www.rceih.by)). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, обтурационная желтуха, детский возраст до 12 лет.

**Передозировка**

При длительном применении высоких доз возможны тошнота, изжога, диарея, кожный зуд, повышение уровня трансаминаз в крови.

**Меры предосторожности**

Применять таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости. Не рекомендуется превышать суточную дозу.

*Применение во время беременности и в период лактации.* Возможно применение во время беременности и лактации по показаниям.

*Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами.* Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности лекарственного средства. При длительном применении возможно снижение всасывания железа.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Упаковка**

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Пять контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

---

Производитель:  
РУП "Белмедпрепараты",  
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,  
e-mail: [medic@belmedpreparaty.com](mailto:medic@belmedpreparaty.com)

