


БЕПАНТЕН®
Листок-вкладыш
(для пациентов)

Торговое название
Бепантен

Международное непатентованное название
Декспантенол

Лекарственная форма
Мазь для наружного применения



Описание
Гомогенная мазь белого цвета с желтоватым оттенком со специфическим запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения ран и язв. Ранозаживляющие средства. D03AX03

Состав

1 г мази содержит

Действующее вещество: декспантенол 50 мг.

Вспомогательные вещества: цетиловый спирт, стеариловый спирт, пчелиный воск белый (E901), парафин белый мягкий, миндалевое масло, парафин жидкий, ланолин (E913), протегин X, очищенная вода.

Фармакологические свойства

Декспантенол представляет собой спиртовой аналог пантотеновой кислоты и имеет такую же биологическую активность. Декспантенол быстро проникает в клетки и превращается в пантотеновую кислоту, которая оказывает тот же эффект, что и витамин В₅.

Пантотеновая кислота и ее соли представляют собой водорастворимые витамины, входят в состав ацетилкоэнзима А и играют важнейшую роль в многочисленных обменных процессах. Таким образом, декспантенол может удовлетворить повышенную потребность организма в пантотеновой кислоте, которая необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек. Большей частью выводится из организма с мочой и калом в неизменном виде.

Показания к применению

Активизация процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах и ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи и эрозии шейки матки; при лечении кортикостероидами.

Уход за сухой и потрескавшейся кожей.

Профилактика и лечение опрелостей у грудных детей.

Регулярный уход за молочными железами в период кормления грудью, лечение болезненности или трещин сосков.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносить мазь один или более раз в день по необходимости.

Уход за молочными железами кормящих матерей: наносить на соски после каждого кормления.


Побочные действия

Перечисленные ниже побочные эффекты основаны на спонтанных сообщениях. Определить точную частоту встречаемости каждого из них не представляется возможным.

Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, в том числе кожные – контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырковая сыпь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Передозировка**

Декспантенол хорошо переносится даже в высоких дозах и считается нетоксичным.

Меры предосторожности

Ланолин, стеариловый и цетиловый спирты могут вызвать раздражение кожи (например, контактный дерматит).

Следует избегать попадания мази в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Другие взаимодействия:

В случае лечения ран в генитальной или анальной области вспомогательные вещества, содержащиеся в мази, приводят к снижению прочности и разрывам латексных презервативов, тем самым снижая их безопасность.

Беременность и лактация

Нет никаких ограничений по использованию мази в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами

Не влияет.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

Алюминиевая туба 3,5 г, 30 г или 100 г. Туба вместе с листком-вкладышем помещена в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,

Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

ГП Гренцах Продукционс ГмбХ,

Эмиль-Барелл-Штрассе 7, D-79639 Гренцах-Вилен, Германия