



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ТЕТРАЦИКЛИН
(TETRACYCLINUM)

Прочитайте внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Внимательно прочитайте весь Листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию. Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в листке-вкладыше (инструкции).

Сохраните этот Листок-вкладыш. Вам может понадобится перечитать его снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат предназначен лично для Вас и не следует передавать его другим лицам. Это может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Название лекарственного средства

Тетрациклин мазь глазная 1 %.

Международное непатентованное название:

Тетрациклин (*Tetracycline*).

Форма выпуска

Мазь глазная.

Мазь от желтоватого до желтовато-коричневого цвета.

Состав лекарственного средства

1 г мази содержит:

Активное вещество: тетрациклин – 0,01 г

Вспомогательные вещества: ланолин безводный, вазелин.

Фармакологические свойства

Бактериостатический антибиотик из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к подавлению синтеза белка в микробной клетке.

Показания к применению

Бактериальные (в т. ч. хламидийные) глазные инфекции, вызванные чувствительными к тетрациклину микроорганизмами - блефарит, блефароконъюнктивит, кератит, кератоконъюнктивит, мейбомит (ячмень), трахома.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к тетрациклину или аналогичным ему антибиотикам (доксциклин, метациклин, окситетрациклин), вспомогательным компонентам препарата;
- беременность и период лактации;

- детский возраст (до 8 лет);
- грибковые заболевания глаз;
- системная красная волчанка;
- глубокие или колотые раны;
- тяжёлые ожоги;
- длительное применение при заболеваниях печени или почек;
- лейкопения.

Передозировка

При применении препарата передозировка маловероятна.

Особые предостережения

Препарат содержит ланолин, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Если в течение нескольких дней состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.

Беременность и кормление грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим четкости зрения сразу после применения препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.


Способ применения и дозировка

Местно.

Полоску мази от 0,5 до 1 см закладывают за нижнее веко.

- при блефарите, блефароконъюнктивите: 3-4 раза в день в течение 5-7 дней;
- при кератите, кератоконъюнктивите: 2-3 раза в день в течение 5-7 дней. Если в течение первых 3-5 дней лечения состояние не улучшается, то следует проконсультироваться с врачом;
- при мейбомите (ячмень): на ночь до исчезновения симптомов воспаления;
- при трахоме: каждые 2-4 ч или чаще в течение 1-2 недель. При стихании воспалительного процесса препарат применяют 2-3 раза в день. Длительность курса лечения трахомы 1-2 месяца.

Длительность лечения устанавливается врачом.



7961 - 2020

Побочное действие

Аллергические реакции (сыпь, отёк Квинке), гиперемия и отёк век, преходящее затуманивание зрения.

Если любые указанные в листке-вкладыше побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные реакции, не указанные в листке-вкладыше, сообщите об этом Вашему врачу.

Условия хранения и срок годности

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

3 года. Хранить после первого вскрытия упаковки не более 6 недель.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Упаковка

По 3 г или 10 г в тубы алюминиевые.

Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7 (843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Зам. генерального директора по технологиям
АО "Татхимфармпрепараты"

