

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

ЭССЕНЦИГЛИВ



Торговое название: Эссенциглив

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: одна капсула содержит: фосфолипидов – 65 мг (в виде липоида ППЛ-400 – 84,4 мг), тринатрия глицеризината – 35 мг.

Вспомогательные вещества: воск пчелиный, подсолнечное масло рафинированное.

Состав оболочки капсул: желатин, глицерин, вода очищенная, натрия бензоат Е-211, титана диоксид Е-171, красители: железа оксид красный Е-172, железа оксид желтый Е-172, железа оксид черный Е-172.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, светло-коричневого цвета.

Содержимое капсул – от светло-желтого до темно-желтого цвета однородная масса от мазеобразной до более плотной консистенции со своеобразным запахом. При хранении допускается незначительное расслаивание содержимого капсул.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения заболеваний печени.

Код ATX A05BA.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Комбинированный препарат. Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.

Фосфатидилхолин (основное действующее вещество фосфолипидов) является структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие. Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает детоксицирующую функцию печени, ингибитирует образование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.

Глицеризинаты (глицеризиновая кислота и ее соли) обладают противовоспалительным действием, подавляют репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, повышения фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-киллеров. Оказывают гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Потенцируют действие эндогенных глюкокортикоидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.

Фармакокинетика.

Всасывание.

После приема внутрь компоненты препарата хорошо всасываются из ЖКТ как в виде целой молекулы, так и в виде биоактивных продуктов гидролиза (ненасыщенные жирные кислоты, холин, глицирретовая кислота).

Распределение.

Биоактивные продукты гидролиза хорошо распределяются в организме, проникают в печень, легкие, кожу и другие органы.

Показания к применению

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Эссенциглив применяют в составе комплексной терапии вирусного гепатита (острого и хронического), жировой дегенерации печени (гепатоза), других поражений печени (лекарственных, алкогольных, токсических), цирроза печени.

Способ применения и дозы

Эссенциглив применяют внутрь во время еды по 1-2 капсулы 3-4 раза в сутки, запивая небольшим количеством жидкости.

Продолжительность терапии определяется врачом на основании оценки соотношения польза/риска.

Меры предосторожности

Применять с осторожностью у больных с портальной гипертензией, у больных с артериальной гипертонией.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания

Не применяют.

Дети

Не применяют у детей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное применение с тиазидными диуретиками, сердечными гликозидами, кортикоステроидами, стимулирующими слабительными средствами или другими лекарственными препаратами, которые способны усиливать электролитный дисбаланс.

Побочное действие

Дermatологические реакции: при повышенной индивидуальной чувствительности возможно появление кожной сыпи, которая исчезает при отмене препарата.

При превышении суточных доз могут отмечаться задержка натрия и жидкости, отеки, повышение артериального давления, гипокалиемия. При появлении указанных симптомов, в зависимости от их выраженности, необходимо уменьшить дозу препарата и/или назначить спиронолактон 50-100 мг в сутки.

Передозировка

Глицерризиновая кислота, входящая в состав препарата, в больших дозах может вызвать псевдокортикоидный эффект, представляющий собой повышение уровня глюкокортикоидов и минералокортикоидов в крови. Это при-

водит к задержке в организме натрия и жидкости с одновременным уменьшением содержания калия, и, как следствие, к повышению уровня артериального давления и отекам.

Лечение: в случае передозировки лечение симптоматическое.



- Противопоказания**
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
 - антифосфолипидный синдром;
 - беременность;
 - период лактации (грудного вскармливания);
 - детский возраст до 18 лет.

Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой
Не влияет.

Форма выпуска

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком вкладышем в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Информация о производителе

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26