

<b>СОГЛАСОВАНО</b>		
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ		
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ		
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь		
от <u>29</u> <u>04</u>	<u>20</u> <u>19</u> г. № <u>579</u>	
КЛС № <u>3</u>	от « <u>29</u> <u>03</u> <u>20</u> <u>19</u> г.	

## Листок-вкладыш – информация для пациента

**ТРИМЕТАЗИДИН,**

**таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг**

**Действующее вещество: триметазидина дигидрохлорид**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что собой представляет препарат ТРИМЕТАЗИДИН и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ТРИМЕТАЗИДИН
3. Применение препарата ТРИМЕТАЗИДИН
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ТРИМЕТАЗИДИН
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### **1. Что собой представляет препарат ТРИМЕТАЗИДИН и для чего его применяют**

Этот препарат применяется у взрослых пациентов для лечения стенокардии (боль в груди, вызванная ишемической болезнью сердца) в комбинации с другими препаратами.

### **2. О чем следует знать перед применением препарата ТРИМЕТАЗИДИН**

**Не принимайте ТРИМЕТАЗИДИН, если:**


- у Вас есть аллергия на триметазидин или на любой из компонентов препарата (см. раздел 6);
- у Вас болезнь Паркинсона: заболевание мозга, приводящее к двигательным нарушениям (дрожание, скованное положение тела, замедление движений и шарканье, нарушение походки);
- у Вас имеется тяжелое заболевание почек;
- Вы беременны или кормите грудью.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать ТРИМЕТАЗИДИН.

Этот препарат не предназначен для купирования приступов стенокардии, а также в



качестве начального лечения при нестабильной стенокардии. Данный препарат не применяют для лечения инфаркта миокарда.

В случае приступа стенокардии проинформируйте об этом своего врача. Вам могут быть назначены обследования, а лечение возможно будет откорректировано.

Если Вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь к Вашему доктору или фармацевту за советом. Этот препарат может вызвать или ухудшить такие симптомы как дрожание, скованное положение тела, нарушение походки, замедление движений и шарканье, особенно у пожилых пациентов, что должно быть отслежено и о чем необходимо сообщить доктору, который может произвести переоценку лечения.

Также могут наблюдаться падения, которые могут быть следствием снижения давления или потери равновесия (см. раздел 4).

ТРИМЕТАЗИДИН содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

#### ***Дети и подростки***

ТРИМЕТАЗИДИН не рекомендуется принимать детям до 18 лет.

#### ***Другие препараты и препарат ТРИМЕТАЗИДИН***

Сообщите вашему врачу, фармацевту или медсестре, если Вы принимаете, недавно принимали или могли принимать какие-либо другие лекарства.

Взаимодействий с другими медицинскими препаратами отмечено не было.

#### ***Прием ТРИМЕТАЗИДИНА с пищей и напитками***

ТРИМЕТАЗИДИН можно принимать с пищей и напитками.

#### ***Беременность, грудное вскармливание и fertильность***

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Предпочтительно не принимать данный препарат во время беременности. Если за время приема препарата обнаружится, что Вы беременны, необходимо проконсультироваться с врачом, так как только он может судить о необходимости продолжения Вашего лечения. Ввиду отсутствия данных о выделении препарата в грудное молоко, грудное вскармливание не рекомендуется во время лечения препаратом ТРИМЕТАЗИДИН.

#### ***Управление транспортными средствами и работа с механизмами***

Во время лечения не рекомендуется управлять автотранспортом и работать со сложными механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и высокой скорости реакций, так как ТРИМЕТАЗИДИН может вызвать головокружение и сонливость.

### **3. Применение препарата ТРИМЕТАЗИДИН**

Соблюдайте все инструкции, предоставленные Вам врачом или медсестрой. Проконсультируйтесь с врачом или медсестрой, если Вам необходима дополнительная информация.


Рекомендуемая доза 20 мг (1 таблетка) 3 раза в день.

Если у Вас проблемы с почками или Ваш возраст превышает 75 лет, Ваш врач может корректировать рекомендуемую дозу.

#### ***ТРИМЕТАЗИДИН в сочетании с едой и напитками***

ТРИМЕТАЗИДИН может приниматься с пищей и напитками.

#### ***Если Вы забыли принять ТРИМЕТАЗИДИН***



Если Вы забыли принять препарат, примите следующую дозу в обычное время. Не удваивайте последующую дозу взамен забытой дозы.

**Если Вы приняли больше ТРИМЕТАЗИДИНА, чем Вам рекомендовано**

Если Вы приняли слишком много таблеток, немедленно обратитесь к врачу.

**Если Вы прекратили прием ТРИМЕТАЗИДИНА**

Ваш врач скажет, как долго необходимо продолжать лечение. Вам необходимо посоветоваться с врачом перед тем, как прекращать прием этого препарата.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по поводу использования этого препарата, обратитесь к врачу, фармацевту или медсестре.

**Способ применения**

Препарат применяют внутрь, проглатывая таблетку целиком и запивая стаканом воды во время еды.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Как и все лекарственные препараты, ТРИМЕТАЗИДИН может вызвать нежелательные реакции, хотя они встречаются не у всех.

**Некоторые нежелательные реакции могут носить серьезный характер.**

- Часто (может проявляться более чем у 1 из 100 человек):

Головокружение, головная боль, боль в животе, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, сыпь, зуд, крапивница и ощущение слабости.

- Редко (может проявляться более чем у 1 из 10 000 человек):

Быстрое или нерегулярное сердцебиение (также называемое трепетание), дополнительные сердечные удары, ускорение сердцебиения, падение кровяного давления при вставании (которое может сопровождаться головокружением), легкое головокружение или обморок, недомогание (общее ощущение нездоровья), головокружения, падения, приливы крови к лицу.

- Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным):

Экстрапирамидные симптомы (необычные движения, включая дрожание и тряску рук и пальцев, волнообразные движения в теле, шаркающая походка и жесткость рук и ног), обычно обратимые после прекращения лечения.

Вертigo (ощущение вращения окружающих предметов).

Расстройства сна (трудности с засыпанием, сонливость), запоры, серьезная генерализованная красная кожная сыпь с образованием пузырей, опухание лица, губ, рта, языка или горла, что может вызвать затруднение глотания или дыхания.

Серьезное снижение количества лейкоцитов в крови, которое делает наступление инфекции более вероятным, снижение тромбоцитов, что повышает риск кровотечения и синяков.

Болезни печени (тошнота, рвота, потеря аппетита, общее чувство болезни, жар, зуд, пожелтение кожи и глаз, светлоокрашенный кал, темноокрашенная моча).

**Сообщение о нежелательных реакциях**

*Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.*

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## 5. Хранение препарата ТРИМЕТАЗИДИН

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Храните препарат в оригинальной упаковке.

Срок годности – 3 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что ячейка, в которой находится таблетка, повреждена.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. Внешний вид препарата ТРИМЕТАЗИДИН и содержимое упаковки

Действующим веществом препарата ТРИМЕТАЗИДИН является триметазидина дигидрохлорид 20 мг.

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, кальция стеарат, лактоза моногидрат, оболочка (гипромеллоза 2910, полисорбат 80, титана диоксид, тальк).

### Внешний вид препарата ТРИМЕТАЗИДИН и содержимое упаковки

ТРИМЕТАЗИДИН – таблетки двояковыпуклой формы, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поверхности таблеток допускается неровность пленочного покрытия.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Три контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: