


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

Подорожника большого листа, измельченное сырье
Plantaginis majoris folia



Общая характеристика:

кусочки тонких, голых листьев различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет зеленый или коричневато-зеленый. Запах слабый.

Подорожника большого листа содержат полисахариды, флавоноиды, аукубин, танины и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения. Полисахариды, входящие в состав листьев подорожника, оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, способствуют уменьшению кашлевого рефлекса и связанного с ним сухого кашля.

Показания к применению.

Внутри: в комплексной терапии для симптоматического лечения воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Внутри взрослым и детям старше 12 лет принимать в теплом виде по 3 столовые ложки 2-3 раза в день за 10-15 минут до еды.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настоев рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Возможны аллергические и анафилактические реакции, диспепсические расстройства (тошнота, изжога, боли в эпигастрии). В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Гиперчувствительность, гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей. Применение у детей до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Меры предосторожности. Если во время приема настоя симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Передозировка. Не наблюдалась. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты. Возможно замедление всасывания других лекарственных средств при одновременном приеме.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.
Тел. 8(0152) 94-17-72.

