


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Змеевика корневища, измельченное сырье 50 г в пачке
Bistortae rhizomata

Общая характеристика:

кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет красновато-коричневый, на изломе — розоватый или коричневато-розовый. Запах отсутствует.

Содержит дубильные вещества (танины не менее 15%), крахмал и др. вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие противодиарейные средства.

Фармакологические свойства. Отвар змеевика корневищ обладает вяжущим и противовоспалительным действием.

Показания к применению. Внутрь: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелой диареи после консультации врача.

Местно: для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (стоматиты, гингивиты).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 минут и немедленно процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. При заболеваниях полости рта отвар применяют для полосканий 3-4 раза в день.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Длительность лечения определяется врачом с учетом характера заболевания, достигнутого эффекта и переносимости препарата.

Побочное действие. Аллергические реакции, тошнота, рвота, при длительном применении запор. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Не изучалась.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве. Беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет.

Применение у детей. Применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет противопоказано из-за отсутствия достаточных данных.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации противопоказано.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Принимать другие лекарственные средства не ранее, чем через 1 час после приема отвара во избежание затруднения их всасывания.

Меры предосторожности. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение отвара и обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства диарея сохраняется, при наличии крови в стуле или изменения цвета стула, следует обратиться к врачу.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 3 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

