

**Листок-вкладыш – информация для пациента****Повидон-йод, мазь для наружного применения 100 мг/г**

Действующее вещество: повидона йодированного-100 мг

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Повидон-йод, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Повидон-йод.
3. Прием препарата Повидон-йод.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Повидон-йод.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Повидон-йод и для чего его применяют**

1 г мази содержит действующего вещества - повидона йодированного-100 мг.

Фармакотерапевтическая группа: дерматотропные средства. Йодсодержащие антисептические препараты.

## Показания к применению

- для местного лечения ран или мелких порезов и профилактики инфицирования небольших ожогов;

- в комплексной терапии грибковых или бактериальных инфекций кожи, инфицированных пролежней и трофических язв.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## 2. О чем следует знать перед приемом препарата Повидон-йод

Не используйте препарат:

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на повидон йодированный или какие-либо другие компоненты этого препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- если у вас заболевание щитовидной железы: узловой, коллоидный, эндемический зоб, тиреоидит Хашимото, тиреотоксикоз, аденома щитовидной железы;

- если у вас герпетиформный дерматит Дюринга;

- до и после терапии радиоактивным йодом или сцинтиграфии;

- у новорожденных;

- у детей в возрасте до 2-х лет;

- у беременных (II-III триместр) и в период кормления грудью.

---

## Особые указания и меры предосторожности

Перед началом использования препарата Повидон-йод проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у вас снижена функция щитовидной железы;

- если у вас снижена функция почек;

- если у вас снижена функция печени;


- если вы получаете терапию препаратами лития;

- если вы наносите крем на большую площадь поверхности

Если ваше состояние не улучшается, несмотря на использование препарата Повидон-йод, вам следует сообщить об этом лечащему врачу.

Также сообщите лечащему врачу или работнику аптеки:

- если у вас есть другие заболевания;
- у вас аллергия.



### **Дети и подростки**

Применение мази у новорожденных и детей до 2-х лет противопоказано.

### **Другие препараты и препарат Повидон-йод**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не следует применять одновременно с лекарственными средствами, содержащими следующие ингредиенты: хлоргексидин, дубильную кислоту, серебро.

### **Беременность и лактация**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

---

Повидон-йод не следует использовать в период беременности (с 3-го месяца).


Атомарный йод и йодид-ион легко проникает через плацентарный барьер, выделяется в грудное молоко и может вызвать развитие зоба у ребенка. Если же грудное вскармливание продолжается, нужно прекратить прием лекарственного средства.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Влияния не оказывает.

### 3. Прием препарата Повидон-йод

Всегда используйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.



#### Рекомендуемая доза

Мазь наносят тонким слоем, не втирая, на очаг поражения. Кратность применения мази 1-2 раза в сутки. Продолжительность применения 7-14 дней.

#### Дети и подростки

Детям до 2-х лет и новорожденным применение мази противопоказано.

#### Если Вы использовали больше Повидон-йода, чем предусмотрено

Если Вы нанесли слишком много мази или случайно его проглотили, Вы можете заболеть. Поговорите со своим врачом или обратитесь в больницу как можно скорее.

#### Если вы забыли использовать Повидон-йод


Если Вы забыли нанести мазь, нанесите ее, как только вспомните. Если это близко к тому времени, когда Вы в следующий раз должны будете применить его, подождите до этого времени.

Не наносите дополнительно Повидон-йод, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### Если Вы прекратили использовать Повидон-йод

Если Вы регулярно применяете Повидон-йод, прежде чем прекратить его использование, поговорите со своим лечащим врачом, так как Ваше состояние может ухудшиться.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению этого препарата, обратитесь к своему лечащему врачу или работнику аптеки.



### **Передозировка**

- Металлический привкус во рту, слюнотечение, жжение, боль в полости рта, горло;

- раздражение глаз и отек;
- кожные заболевания
- нарушение функции почек
- сердечная недостаточность
- отек голосовой щели, отек легких.

*Лечение:* симптоматическое.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам Повидон-йод может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызвать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Редкие (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- гиперчувствительность;
- контактный дерматит (например, небольшие волдыри или зуд).

---

Очень редкие (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- гипертиреоз;
- анафилактические реакции;
- ангионевротический отек.


Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- гипотиреоз;
- поглощение электролитов, метаболический ацидоз;
- острая почечная недостаточность, нарушение осмолярности;

- химические ожоги кожи.

НД РБ

1159 Б-2017



### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### **5. Хранение препарата Повидон-йод**

Храните препарат в недоступном для детей месте. Не применяйте препарат после истечения срока годности. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

### **Дата истечения срока годности (срока хранения)**

Срок годности: 2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

---

### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**


#### **Препарат Повидон-йод содержит**

Действующим веществом является: повидон йодированный – 100 мг.  
Прочими вспомогательными веществами являются: макрогол 4000, натрия гидроксид, воду очищенную, макрогол 400.

#### **Внешний вид препарата Повидон-йод и содержимое упаковки**

Мазь коричневого цвета со слабым запахом йода однородной консистенции.

20 г и 55 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.



**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, 222518, ул. Чапаева, 64.

Тел/факс +375(177)735612, 731156.

**Данный листок-вкладыш пересмотрен**

07/ 2022