

Листок-вкладыш: информация для потребителя

Лизиноприл ФТ, 5 мг, таблетки

Лизиноприл ФТ, 10 мг, таблетки

Лизиноприл ФТ, 20 мг, таблетки

лизиноприл

Перед приемом препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл ФТ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл ФТ
3. Прием препарата Лизиноприл ФТ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Лизиноприл ФТ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл ФТ, и для чего его применяют

Лизиноприл ФТ содержит в качестве действующего вещества лизиноприл. Лизиноприл относится к группе ангиотензинпревращающих ферментов, называемых ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (ингибиторы АПФ).

Лизиноприл ингибирует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который необходим для реакции превращения ангиотензина I в ангиотензин II – вещество, которое оказывает сосудосуживающий эффект. Угнетение АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что, в свою очередь, приводит к расширению сосудов. Вследствие этого снижается артериальное давление и уменьшается нагрузка на сердце.

Показания для применения лекарственного препарата Лизиноприл ФТ:

- **Артериальная гипертензия**
Лечение артериальной гипертензии.
- **Сердечная недостаточность**
Лечение сердечной недостаточности.
- **Острый инфаркт миокарда**
Кратковременное (до 6 недель) лечение гемодинамически стабильных пациентов, начатое в период до 24 часов после острого инфаркта миокарда.
- **Диабетическая нефропатия**
Лечение поражения почек у пациентов с гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и начальной стадией нефропатии.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл ФТ

1482 Б-2015

Не принимайте препарат Лизиноприл ФТ:

- если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к лизиноприлу или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас аллергия к другим ингибиторам АПФ. Симптомы аллергической реакции могут включать отек конечностей, лица, губ, языка или горла. Также может возникать затруднение глотания или затруднение дыхания (ангионевротический отек);
- если Вы принимаете или недавно принимали препараты, содержащие сакубитрил/валсартан (препарат для лечения хронической сердечной недостаточности), так как при этом возрастает риск возникновения ангионевротического отека (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить);
- если у члена Вашей семьи была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) на ингибиторы АПФ или если у Вас была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) с известной причиной;
- во втором или третьем триместре беременности;
- если у Вас сахарный диабет или нарушение функции почек, и Вы уже принимаете препараты, содержащие алискрирен.

Не принимайте препарат Лизиноприл ФТ и сообщите врачу, если к Вам относится что-либо из вышеперечисленного.

Если у вас появился сухой кашель, который сохраняется в течение длительного времени после начала лечения препаратом Лизиноприл ФТ, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением лекарственного препарата Лизиноприл ФТ сообщите лечащему врачу:

- если у Вас имеются заболевания сердца или печени, сахарный диабет;
- если у Вас имеется заболевание почек или Вы находитесь на диализе;
- если у Вас имеется коллагенозное сосудистое заболевание, такое как склеродермия или системная красная волчанка;
- если у Вас низкое артериальное давление;
- если у Вас наблюдались значительные потери солей или жидкости (у Вас была рвота, диарея, повышенное потоотделение, пребывание на диете с низким содержанием соли, длительное применение мочегонных препаратов, лечение диализом);
- если Вам предстоит лечение для уменьшения аллергии на укусы пчел или ос (десенсибилизация);
- если Вам предстоит применение анестезии (например, при хирургической или стоматологической операции). Вам может потребоваться прекратить применение лекарственного препарата Лизиноприл ФТ за день до этого. Проконсультируйтесь с врачом;
- если у Вас высокое содержание калия в крови (по результатам анализа крови);
- если Вы применяете препараты, которые могут повысить риск возникновения ангионевротического отека – серьезной аллергической реакции, такие как ингибиторы mTOR (например, темсиролимус, эверолимус, сиролимус), вилдаглиптин, ингибиторы неприлизина (такие как рацекадотрил) или сакубитрил/валсартан. Что касается комбинации сакубитрил/валсартан, см. информацию под заголовком «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ»;
- если Вы применяете любой из следующих лекарственных препаратов для снижения артериального давления:



- антагонисты рецепторов ангиотензина II (также известные как «сартаны» - например, лозартан, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно если у Вас есть проблемы с почками, связанные с сахарным диабетом;
- алискирен.

Возможно, Вашему врачу потребуется регулярно проверять Вашу функцию почек, артериальное давление и содержание электролитов (например, калия) в крови (см. также информацию в разделе «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ»);

- если у Вас высокий уровень холестерина и Вам предстоит процедура, называемая «аферез ЛПНП».

Вы должны сообщить врачу, если Вы думаете или уверены, что беременны (или планируете беременность). Лизиноприл ФТ не рекомендуется применять в первые 3 месяца беременности, и он противопоказан при сроке беременности более 3 месяцев (во втором и третьем триместрах беременности), так как может вызвать серьезные нарушения у ребенка (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»).

Как и в случае с другими схожими препаратами для снижения артериального давления, эффект лекарственного препарата Лизиноприл ФТ может быть несколько ниже у пациентов негроидной расы. У таких пациентов также повышена вероятность возникновения нежелательной реакции «ангивиевротический отек» (тяжелая аллергическая реакция).

Дети и подростки

Препарат Лизиноприл ФТ может применяться у детей только для лечения артериальной гипертензии. Препарат Лизиноприл ФТ не рекомендуется применять у детей младше 6 лет или у детей с тяжелым нарушением функции почек.

Другие препараты и препарат Лизиноприл ФТ

Сообщите Вашему лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Необходимо соблюдать особую осторожность при одновременном приеме препарата Лизиноприл ФТ со следующими препаратами:

- другие препараты для снижения артериального давления;
- нитроглицерин (при ишемической болезни сердца);
- антагонисты рецепторов ангиотензина II (валсартан, телмисартан, ирбесартан) или алискирен. Вашему лечащему врачу может потребоваться скорректировать дозу и/или принять другие меры предосторожности (см. раздел 2 «Не принимайте препарат Лизиноприл ФТ» и «Особые указания и меры предосторожности»);
- диуретики (мочегонные препараты), такие как фуросемид;
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для облегчения боли и воспаления, такие как ибuproфен, индометацин, и ацетилсалциловая кислота в дозах 3 г в сутки и более;
- препараты лития (для лечения депрессии и психических нарушений);
- средства для анестезии, трициклические антидепрессанты и антипсихотические препараты (средства для лечения психических заболеваний);
- средства для лечения сахарного диабета, такие как пероральные препараты для снижения уровня глюкозы и инсулин. Лизиноприл может снизить уровень глюкозы в крови. Проверяйте уровень глюкозы в крови во время лечения препаратом Лизиноприл ФТ;
- препараты, которые могут повысить содержание калия в крови: пищевые добавки (включая заменители соли), калийсберегающие диуретики, триметопrim/сульфаметоксазол (для лечения бактериальных инфекций), гепарин (для разжижения крови и предотвращения образования тромбов);

- циклоспорин (иммunoсупрессант для предотвращения отторжения трансплантата);
- препараты, применяемы при низком артериальном давлении, сердечной недостаточности, астме или аллергии, такие как эфедрин, норадреналин, ксилометазолин и сальбутамол;
- аллопуринол (для лечения подагры);
- прокаинамид (при нерегулярном сердечном ритме);
- препараты, содержащие золото (иммunoсупрессанты).

Следующие препараты при совместном применении с лизиноприлом могут увеличить риск возникновения ангионевротического отека (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить):

- сакубитрил/валсартан – средство, применяемое для лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых (см. информацию под заголовком «Не принимайте лекарственный препарат Лизиноприл ФТ»);
- тромболитические препараты (активаторы тканевого плазминогена), обычно назначаемые в больнице;
- темсиролимус (средство для лечения рака);
- сиролимус, эверолимус (средства для профилактики отторжения трансплантата);
- рацекадотрил (средство для лечения диареи);
- вилдаглиптин (средство для лечения сахарного диабета 2 типа).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Лизиноприл ФТ проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Вы должны немедленно сообщить врачу, если Вы думаете или уверены, что беременны или планируете беременность. В случае планирования или наступления беременности врач порекомендует Вам прекратить прием препарата Лизиноприл ФТ и подберет для Вас другой препарат для контроля артериального давления, если это будет необходимо. Не рекомендуется принимать препарат Лизиноприл ФТ на ранних сроках беременности (в первом триместре беременности).

Препарат Лизиноприл ФТ противопоказан во втором и третьем триместрах беременности, так как может нанести серьезный вред ребенку.

Грудное вскармливание

Сообщите врачу, если Вы кормите грудью или планируете грудное вскармливание.


Препарат Лизиноприл ФТ не рекомендуется принимать кормящим матерям. Ваш врач может назначить Вам другое лечение, если Вы желаете продолжить вскармливание, особенно если Ваш ребенок новорожденный или родился недоношенным.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В некоторых случаях при приеме препарата возникает сонливость или головокружение. При возникновении таких ощущений Вам не следует управлять транспортными средствами или использовать механическое оборудование. Прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механическим оборудованием, Вам необходимо тщательно оценить свою реакцию на прием препарата Лизиноприл ФТ.

Препарат Лизиноприл ФТ содержит натрий

Препарат Лизиноприл ФТ содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в разовой дозе, то есть по сути не содержит натрия.



3. Прием препарата Лизиноприл ФТ

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Прием первой дозы

Соблюдайте осторожность при приеме препарата Лизиноприл ФТ в первый раз или при увеличении дозы, так как возможно более значительное снижение артериального давления, чем при приеме предшествующих более низких доз.

При значительном снижении артериального давления у Вас может возникнуть ощущение головокружения. Переход в лежачее положение поможет облегчить данное состояние.

Взрослые

Доза лизиноприла подбирается лечащим врачом индивидуально в зависимости от Вашего состояния и от того, принимаете ли Вы какие-либо другие лекарственные препараты.

Для лечения артериальной гипертензии

- рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки;
- поддерживающая доза обычно составляет 20 мг 1 раз в сутки.

Для лечения сердечной недостаточности

- рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки;
- поддерживающая доза обычно составляет от 5 до 35 мг 1 раз в сутки.

После острого инфаркта миокарда

- рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг в период до 24 часов после инфаркта миокарда и 5 мг в следующий день;
- поддерживающая доза обычно составляет 10 мг 1 раз в сутки.

Для лечения диабетической нефропатии

- рекомендуемая доза составляет 10 мг или 20 мг 1 раз в сутки.

Если Вы пожилой человек (старше 65 лет), имеете нарушение функции почек или принимаете мочегонные препараты, Ваш лечащий врач может назначить более низкую дозу препарата Лизиноприл ФТ.

Применение у детей (старше 6 лет) для лечения артериальной гипертензии

- препарат Лизиноприл ФТ не рекомендуется детям до 6 лет;
- препарат Лизиноприл ФТ не рекомендуется детям с тяжелой почечной недостаточностью;
- доза лизиноприла подбирается врачом индивидуально в зависимости от массы тела ребенка;
- для детей с массой тела от 20 кг до 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 20 мг 1 раз в сутки);
- для детей с массой тела более 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 40 мг 1 раз в сутки).


В случае необходимости применения лизиноприла в дозе 2,5 мг в сутки таблетки Лизиноприл ФТ 5 мг, 10 мг или 20 мг не могут применяться вследствие высокой дозы действующего вещества в одной таблетке и невозможности разделить таблетку на части с дозой действующего вещества 2,5 мг.

Способ применения


Для приема внутрь.

Принимать таблетки Лизиноприл ФТ рекомендуется ежедневно в одно и то же время независимо от приема пищи. Таблетку необходимо проглотить целиком, запивая достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды).

Если Вы приняли препарата Лизиноприл ФТ больше, чем следовало



14825-2015



Если Вы приняли большее количество препарата, чем следовало, обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи/больницы. По возможности возмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш. При передозировке возможно появление следующих симптомов: головокружение, ощущение сердцебиения.

Если Вы забыли принять препарат Лизиноприл ФТ

Если Вы забыли принять препарат в обычное время, не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную. Просто примите следующую таблетку в обычное время.

Если Вы прекратили прием препарата Лизиноприл ФТ

Не прекращайте прием препарата Лизиноприл ФТ без предварительной консультации с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно другим лекарственным препаратам Лизиноприл ФТ может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

Если Вы заметили у себя появление каких-либо из следующих симптомов, **немедленно прекратите прием препарата Лизиноприл ФТ и обратитесь к врачу:**

- Тяжелые аллергические реакции (частота возникновения редко, могут возникать не более чем у 1 из 1000 человек):
 - ангионевротический отек (отек горлани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить) (см. подраздел «*Особые указания и меры предосторожности при применении*»);
 - ангионевротический отек конечностей;
 - анафилактические/анафилактоидные реакции. Возможные проявления: зудящая красная сыпь, сопровождающаяся воспалением кожи (крапивница); иные разновидности сыпи, покраснение или побледнение кожи; спазм бронхов, приводящий к затруднению дыхания; резкое снижение артериального давления, быстрый и слабый пульс; боль в животе, тошнота, рвота или диарея (жидкий стул); головокружение, обморок или предобмороочное состояние;
- Тяжелые поражения кожи (частота возникновения очень редко, могут возникать не более чем у 1 из 10000 человек):
 - синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (последнее – более тяжелая форма, при которой возникает обширное отслаивание кожи, захватывающее до 30 и более процентов поверхности тела). Проявления: распространенная сыпь в виде красных пятен, пузьрей, болезненных язв, сопровождающаяся шелушением и отслоением кожи и слизистых оболочек; поражаются слизистые оболочки ротовой полости, носа, глаз, половых органов, любые участки кожи; до появления изменений на коже и слизистых оболочках может наблюдаться повышение температуры тела, озноб, боль в горле, головная боль.
- Нейтропения, агранулоцитоз – снижение уровня определенных видов лейкоцитов в крови (частота возникновения очень редко, могут возникать не более чем у 1 из 10000 человек). Нейтропения и агранулоцитоз могут стать причиной инфекционного заболевания, проявляющегося в виде симптомов: повышение температуры тела (лихорадка) и выраженное ухудшение общего самочувствия; повышение температуры

1482 Б-2015

тела с местными симптомами инфекционного заболевания, такими как боль в горле или в полости рта; какие-либо проблемы с мочеиспусканием.

Другие возможные нежелательны реакции

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):


- головная боль;
- головокружение (особенно при резком переходе из горизонтального в вертикальное положение);
- диарея;
- постоянный сухой кашель;
- рвота;
- нарушение функции почек.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- изменение настроения;
- нарушения сна (сонливость, бессонница);
- извращение вкуса;
- парестезия (аномальные ощущения на коже в виде пощипывания, покалывания, жжения);
- вертиго (ощущение движения окружающих предметов вокруг Вас или вращения в пространстве);
- тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений);
- синдром Рейно (изменение цвета пальцев рук или ног (побледнение, вплоть до синюшности, а затем покраснение), или онемение, или покалывание в пальцах рук или ног);
- острое нарушение мозгового кровообращения (инфаркт);
- тошнота;
- боль в желудке, нарушение пищеварения;
- кожная сыпь, зуд;
- ринит (обильные выделения из носа);
- импотенция;
- повышенная утомляемость, астения (непрходящее чувство усталости);
- инфаркт миокарда;
- зрительные и/или слуховые галлюцинации;
- изменения в показателях крови, характеризующих работу печени и почек (повышение концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови, повышение активности печеночных ферментов, гиперкалиемия);
- ортостатические эффекты (включая гипотензию – снижение артериального давления): чрезмерное падение артериального давления при переходе из горизонтального положения или положения сидя в вертикальное положение может наблюдаться у людей со следующими состояниями: ишемическая болезнь сердца; сужение аорты (аортальный стеноз), артерий почек или сердечных клапанов; гипертрофическая кардиомиопатия (утолщение сердечной мышцы). Возможные проявления: чувство головокружения, особенно при резком переходе в вертикальное положение.

Редко (могут возникать не более чем у 1 из 1000 человек):

- спутанность сознания;
- узелковая кожная сыпь;
- сухость во рту;
- алопеция (выпадение волос);
- псориаз (кожное заболевание);
- изменение обоняния;



1482 Б-2015

- гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин);
- изменение со стороны некоторых клеток или других компонентов крови (снижение гемоглобина, снижение гематокрита). Ваш врач может периодически проводить анализ крови, чтобы выяснить, повлиял ли прием препарата на кровь;
- гипонатриемия (снижение уровня натрия в крови). Симптомы могут включать усталость, головную боль, тошноту, рвоту.
- острые почечные недостаточности.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- синусит (возможные проявления: заложенность носа, головная боль в височных и лобных областях);
- бронхоспазм (затруднение дыхания, может сопровождаться одышкой, свистящим дыханием);
- гипогликемия (снижение уровня сахара в крови). Возможные проявления: внезапное чувство голода, слабость, потливость, учащение сердцебиения.
- аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония (воспаление легких). Возможные проявления: кашель, учащенное дыхание, высокая температура тела;
- желтуха (желтое окрашивание кожи и белков глаз);
- гепатит (воспаление печени). Возможные проявления: потеря аппетита, желтое окрашивание кожи и белков глаз, темная моча;
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Возможные симптомы: умеренная или сильная боль в области желудка;
- потливость;
- олигурия/анурия (уменьшение количества отделяемой мочи/прекращение выделения мочи);
- печеночная недостаточность;
- доброкачественный лимфаденоз кожи. Проявления: высыпания в виде мелких папул или в виде бляшек различного диаметра, могут сопровождаться зудом;
- воспаление кишечника.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- симптомы депрессии;
- обморок.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Лизиноприл ФТ


Храните препарат в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °C. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности – 3 года. Срок годности указан на упаковке.

Не применяйте препарат после истечения срока годности.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения



Препарат Лизиноприл ФТ содержит в качестве действующего вещества лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата).

Лизиноприл ФТ 5 мг: каждая таблетка содержит 5,0 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Лизиноприл ФТ 10 мг: каждая таблетка содержит 10,0 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Лизиноприл ФТ 20 мг: каждая таблетка содержит 20,0 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ 101), крахмал кукурузный, кальция гидрофосфат безводный, натрия крахмалгликолят (тип А), повидон (K25), магния стеарат, маннитол.

Внешний вид лекарственного препарата Лизиноприл ФТ и содержимое упаковки
Таблетки.

Лизиноприл ФТ 5 мг: круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета.

Лизиноприл ФТ 10 мг: круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской.

Лизиноприл ФТ 20 мг: круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой или жесткой пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой. Каждые 3 или 6 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Фармтехнология»

Республика Беларусь

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88.

E-mail: ft@ft.by.



Данный листок-вкладыш пересмотрен